

Чугульков В. А.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ТРОФИЧЕСКИХ ЯЗВ

Научный руководитель ассист. Терешко Д. Г.

Кафедра военно-полевой хирургии

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск

Актуальность. Трофические язвы венозной этиологии составляют более 60% от всех язв нижних конечностей, в значительной степени снижают все аспекты качества жизни пациентов и становятся причиной не только физических страданий, но и создают серьезные психологические проблемы. На данный момент актуальность проблемы не только не снижается, но и имеет прогрессирующую тенденцию к возрастанию.

Цель: оценить отдаленные результаты лечения пациентов с венозными трофическими язвами, выявить причины рецидивов венозных трофических язв.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 65 историй болезни пациентов с трофическими язвами венозной этиологии, находившихся на лечении во втором хирургическом отделении 432-го Главного клинического военного медицинского центра. Осуществлялся осмотр пациентов и анкетирование по разработанному опроснику. В дальнейшем, на основании результатов опроса осуществлялась оценка эффективности проведенного лечения. Период наблюдения составил 1 год.

Результаты и их обсуждение. Общее количество пациентов составило 65 человек. По половой принадлежности пациенты распределились следующим образом: мужчин – 28 (43 %), женщин – 37 (57 %). Возраст пациентов варьировал от 40 до 79 лет, средний возраст составил 57 лет. Общая длительность лечения была от 1 до 32 дней, средний срок лечения – 14 дней. По формам заболевания: пациенты с варикозной болезнью – 34 (52 %), пациенты с ПТФС- 31 (48 %). Операции выполнялись пациентам 34 (52 %). Антибиотикотерапия применялась у 41 пациентов (63 %).

У всех пациентов анализировались результаты ультразвукового исследования.

Выводы.

1. Самостоятельное заживление ран маловероятно без коррекции патологического венозного кровотока.
2. Выполнение УЗ – исследования перед операцией обязательно.
3. При плановом лечении в большинстве случаев отмечается использование антибактериальной терапии.
4. Отмечается недостаточное акцентирование внимания со стороны пациентов на комплексное лечение с применением компрессионного трикотажа.