

*Евсеев Г. М.*

## **ПОВТОРНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПРИ ПАТОЛОГИИ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ**

*Научный руководитель: д-р мед. наук, проф. Жидков С. А.*

*Кафедра военно-полевой хирургии*

*Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск*

**Актуальность.** За последние несколько лет значительно изменилась структура острых хирургических заболеваний органов брюшной полости, методы обследования и лечебная тактика, что позволило улучшить результаты лечения и снизить летальность. Тем не менее, хирургические заболевания органов брюшной полости и в настоящее время - одна из самых сложных проблем медицины. Они являются наиболее серьезными среди всех хирургических недугов.

Особенного внимания требует группа болезней, объединенных названием «острый живот»: острый аппендицит, острый холецистит, острый панкреатит, непроходимость кишечника, ущемленные грыжи, перфоративную язву желудка и двенадцатиперстной кишки и желудочно-кишечные кровотечения.

Даже в случае своевременной постановки диагноза и проведенного оперативного лечения, возникает ситуация, когда пациенту необходима повторная операция с целью спасения жизни. Причины возникновения таких осложнений и способы их разрешения до настоящего времени до конца не изучены.

**Цель:** установить наиболее частые заболевания, которые в последствии осложняются и требуют проведения повторных операций. Определить показания, требовавшие проведения повторных операций, основные способы проведения повторных операций в абдоминальной хирургии. Изучить исходы повторных оперативных вмешательств.

**Материалы и методы.** Проведен анализ 20 медицинских карт пациентов, госпитализированных в период с 2018 по 2021 год в УЗ 2 ГКБ г. Минска, с различными заболеваниями органов брюшной полости, которым проведено оперативное лечение с последующими осложнениями. Последние потребовали повторные операции.

Среди пациентов: мужчин - 13, средний возраст составил 55,5 лет, женщин - 7, средний возраст составил 68,3 лет.

**Результаты и их обсуждение.** Пациенты, требующие проведения повторных операций, - это как правило пожилые люди с наличием сопутствующей патологии. Наиболее частыми причинами повторных операций явились: несостоятельность швов межкишечного анастомоза, а также продолжающийся перитонит. Повторные операции выполнялись двумя способами: релапаротомия и релапароскопия (как повторная, так и после лапаротомии). Имелась группа пациентов, в количестве 7 человек, которым выполнялось 2 повторные операции. 3 пациентам проводилось более 3 операций, период их госпитализации составил более 31 дня.

**Выводы.** Хирургические заболевания органов брюшной полости - одна из наиболее опасных групп всей хирургической патологии. Своевременно выполненная повторная операция в абдоминальной хирургии позволяет достичь приемлемых результатов лечения и спасти жизнь пациенту с тяжелой прогрессирующей патологией.