

СОВРЕМЕННЫЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВЫХ И СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КЛИНИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕПАРАТОВ «МЕТРОГИЛ ДЕНТА» И ЛИНКОМИЦИНОВОЙ ПЛЁНКИ ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ ПЕРИОДОНТИТАХ

Белясова Л.В., Новицкая М.А., Пешко Н.Г.

*УО «Белорусский государственный медицинский университет»,
г. Минск, Беларусь*

Введение. Хронические воспалительные заболевания периодонта являются одной из важнейших проблем современной стоматологии. Следует отметить, что наиболее часто для лечения болезней периодонта на современном этапе применяются такие препараты, как «Метрогил Дента» и линкомициновая плёнка.

Цель работы - провести сравнительный анализ клинической эффективности применения препаратов «Метрогил Дента» и линкомициновая плёнка при лечении пациентов с хроническим периодонтитом.

Объекты и методы. Проведено лечение 22 пациентов в возрасте 25-45 лет. В том числе 17 мужчин и 5 женщин с диагнозом: хронический периодонтит средней степени тяжести. Пациенты в возрастном аспекте и по степени выраженности патологического процесса были равноценны. После проведенного подготовительного этапа лечения (профессиональная гигиена, мотивация и контроль прироста зубного налета) в периодонтальные карманы вводили линкомициновую пленку (10 пациентам ежедневно в течение недели) и «Метрогил Дента» через инъекционную иглу по 0,3-0,5 мг под защитную повязку (12 пациентам). Клиническую эффективность использования средств «Метрогил Дента» и линкомициновой пленки при указанной патологии осуществляли на основании данных индексов ОНІ-S, РМА, ИПК.

Результаты. По данным проведенного исследования, констатирована значительная динамика уменьшения показателей тяжести воспалительного поражения тканей периодонта по данным индексов РМА, ИПК при применении препаратов «Метрогил Дента» и линкомициновой плёнки. Однако большей клинической эффективностью обладает препарат «Метрогил Дента».

Заключение. Таким образом, «Метрогил Дента» может быть рекомендован к более широкому использованию в клинической

практике при комплексном лечении пациентов с хроническим периодонтитом.