

Проблемы современной пластической хирургии

Мамедова Саали, Бойкова Анна

Белорусский государственный медицинский университет, Минск

Научный(-е) руководитель(-и) Сушкевич Полина Всеволодовна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск

Введение

Современная пластическая хирургия начала формироваться в 1960-х – 1970-х годах. В это же время появились силиконовые имплантаты, которые первоначально использовались для лечения определённых недостатков кожи. В течение 70-х годов силиконовые имплантаты стали использовать практически на всех частях тела и лица.

Цель исследования

Наиболее важной тенденцией в пластической хирургии является переход к менее инвазивным процедурам против старения.

Материалы и методы

Сегодня пластическая хирургия пользуется огромной популярностью. Медицинские достижения сделали возможным перекроить всё тело по желанию пациента.

Результаты

Современная пластическая хирургия направлена не только на улучшение качества жизни. Хирурги, ушедшие из оперативной хирургии, жертвуют своим временем и многочисленными талантами на выполнение таких операций, как увеличение груди, липосакцию или ринопластику. Хирурги с большим опытом работы вполне могли бы проводить реконструктивные операции у людей с врождёнными дефектами. Для многих пластических хирургов работа — это всего лишь способ заработать. Популярность пластических операций растёт с каждым годом. За последние 5 лет их количество во всём мире выросло в среднем на 21%. Иногда увлечение пластическими операциями переходит все мыслимые и немыслимые границы. Увеличив грудь, женщина хочет исправить форму носа, подтянуть веки, откачать жировую ткань из ягодиц и т.д. Это не всегда идёт на пользу организму. В таком случае можно говорить о психологической зависимости.

Выводы

Не каждая пластическая операция проходит успешно, и в отличие от операций по медицинским показаниям, успех пластической хирургии является весьма субъективным. Самое худшее осложнение пластической операции — постоянная боль, невралгия или локализованный паралич, фактически после такой операции человек может остаться инвалидом на всю жизнь.