

## **Распространённость гингивита у детей подросткового возраста**

*Киреева Анна Витальевна, Ткачёва Александра Владимировна*

*Белорусский государственный медицинский университет, Минск*

*Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Гулько Елена*

*Михайловна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск*

*кандидат медицинских наук, доцент Боровая Мария Леонидовна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск*

### **Введение**

В Республике Беларусь распространённость гингивита у детей шестилетнего возраста составляет 10-15%. С возрастом количество детей с воспалением десны увеличивается и к подростковому возрасту достигает 83-100% (Т. Н. Терехова, 2012).

### **Цель исследования**

Определить распространённость гингивита у детей подросткового возраста и изучить причины его возникновения.

### **Материалы и методы**

Определён стоматологический статус у 64-х школьников 13-16-летнего возраста СШ №81 г. Минска. Следуя рекомендациям ВОЗ, оценка кариеса зубов у детей проводилась путём определения показателей распространённости и интенсивности (КПУз). Гигиена полости рта оценена индексом ОНI-S (Грин-Вермильон, 1964). Для определения состояния периодонта использован индекс КПИ (П. А. Леус, 1988). Данные осмотра внесены в карту обследования и статистически обработаны.

### **Результаты**

Цифры, полученные при подсчётах, будут представлены в презентации на конференции.

### **Выводы**

Высокая распространённость гингивита у детей подросткового возраста в 78% случаев связана с некачественной гигиеной полости рта.