

Болезнь Крона - долгий путь от симптома к диагнозу

Чирок Елена Александровна

Белорусский государственный медицинский университет, Минск

Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Назаренко Ольга Николаевна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск

Введение

БК является распространённым заболеванием среди детского населения. Это связано с трудностями в определении этиологии заболевания и диагностики. Исходя из этого, наша работа является актуальной, так как она направлена на выявление первых тревожных симптомов и проявлений в отношении данной болезни, вероятных причин её возникновения, с целью своевременного обращения за медицинской помощью.

Цель исследования

Оценить процесс постановки диагноза у детей с БК по данным ГЭО 4 ДКБ, проанализировав 14 историй болезней пациентов.

Материалы и методы

14 историй болезней пациентов, находившихся с 25.04.2012 по 15.05.2015 на лечении в ГЭО 4 ДКБ.

Результаты

1. При изучении симптомов и жалоб пациентов, наиболее часто встречались следующие: болезненность живота при пальпации(61,5%); редкий стул(46%); жидкий стул(38,5%); периодические головные боли(31%); белый налёт на языке(31%); стул, с примесью крови(31%); отрыжка воздухом(23%); частый стул(23%); бледность кожных покровов(23%).

2. Из анализа вариантов локализации БК из всей выборки чаще встречались: толстой кишки – 43%; тонкой кишки – 36%; толсто-тонкокишечная -14%; сочетанная форма с поражением желудка – 7%.

3. Из сопутствующих заболеваний часто встречались: НР-ассоциированный хронический гастроудоденит(54%); ДХЛЖ(46%); БА(23%); хр. тонзиллит(23%); анемия(23%); ДГР(15%).

4. Среди пациентов с БК преобладал мужской пол (71,4%). Распределение по возрасту: 1-3 лет -14,2%; 4-6 лет -0%; 7-12 лет - 28,5%; 13-17 лет -57%.

5. В семейном анамнезе пациентов у большинства родителей встречались: хр. гастрит, хр. гастроудоденит, язвенная болезнь, хр. тонзиллит. У 8 пациентов наследственность отягощена, у 2-х – не отягощена, у 3-х – нет данных.

Выводы

1. У большинства пациентов имеются сходства проявления симптомов заболевания.
2. Наиболее часто встречается БК у категории детей от 13 до 17 лет.
3. Наличие у пациента и у его родных хронических заболеваний, в частности болезней ЖКТ, позволяют отнести его к группе риска.