

Некоторые особенности клинико- и лабораторных проявлений сочетанного употребления психоактивных веществ и алкоголя

Воронко Наталья Владимировна, Гладкая Ольга Сергеевна

Белорусский государственный медицинский университет, Минск

Научный(-е) руководитель(-и) Самохвал Ольга Владимировна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск

Введение

Злоупотребление ПАВ — широко распространённая проблема, которая наносит человечеству возрастающий урон. Диагноз «Сочетанное употребление ПАВ и алкоголя с вредными последствиями» всё чаще ставится молодым людям в возрасте 13-17 лет. Подростковый организм не в состоянии противостоять действию психоактивных веществ вследствие недостаточной зрелости многих систем организма, что приводит к негативным последствиям.

Цель исследования

Целью данной работы стало изучение морфофункциональных и психоэмоциональных изменений у пациентов.

Материалы и методы

Проведён анализ диагностики и лечения 35 пациентов в возрасте от 13 до 17 лет, направленных с диагнозом «Сочетанное употребление психоактивных веществ и алкоголя с вредными последствиями» и находившимися на лечении в УЗ «4ДГКБ» в 2013-2014 г.

Результаты

При постановке данного диагноза необходимо наличие непосредственного ущерба, причиненного психике или физическому состоянию потребителя. Употребление вещества часто критикуется окружающими и связано с различными негативными социальными последствиями. Тот факт, что употребление определенного вещества вызывает неодобрение со стороны другого лица или общества в целом или может привести к социально негативным последствиям, таким как арест еще не является доказательством употребления с вредными последствиями. В результате проведенного анализа было выявлено, что наиболее «популярным» ПАВ являются спайсы и курительные смеси. Чаще всего употребляют молодые люди в возрасте 15-16 лет, воспитывающиеся в неполных семьях. Пик регистрации случаев отравления ПАВ приходится на весенние месяцы. У 87% подростков отмечаются диффузные изменения на ЭЭГ, наличие артимий - у 40%, диффузные изменения в паренхиме печени и поджелудочной железы - у 57% пациентов, у 90% наблюдалась эозинофилия, лейко- и эритроцитоз. У 100% подростков были выявлены изменения в психическом статусе: эмоциональная лабильность, повышение психопазии, агрессивность, склонность к аддиктивному и девиантному поведению. Следует отметить немаловажную роль семьи в успехе лечения данного заболевания.

Выводы

Наши результаты свидетельствуют о пагубном влиянии употребления ПАВ на все системы растущего организма. Необходимо разработать и широко внедрить меры по профилактике наркомании среди подростков, формирование мотивации на лечение от зависимости, укреплении авторитета семьи.