

## **Анализ заболеваемости карциномой Меркеля и ближайших результатов ее лечения в г.Минске с 2010 по 2015 гг.**

*Остапенко Егор Андреевич, Сенчук Анастасия Игоревна*

*Белорусский государственный медицинский университет, Минск*

*Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, доцент Колобухов Алексей Эдуардович, Белорусский государственный медицинский университет, Минск*

### **Введение**

Карцинома Меркеля – злокачественная опухоль кожи, которая возникает из нейроэндокринных клеток эпидермиса (клеток Меркеля) и относится к нейроэндокринным опухолям. Она является довольно редким и на данный момент малоизученным заболеванием. Впервые это заболевание было описано чуть более 40 лет назад, однако, за прошедшее время было добавлено лишь небольшое количество клинических наблюдений.

### **Цель исследования**

Изучить заболеваемость карциномой Меркеля и оценить ближайшие результаты ее лечения.

### **Материалы и методы**

Материалом для исследования послужили данные из амбулаторных карт 15 пациентов с морфологически верифицированной карциномой Меркеля, находившихся на лечении в МГОД в период с 2010 по 2015 годы. Сравнивались пол и возраст пациентов, обстоятельства выявления заболевания, стадии и локализация опухоли, методы лечения и их ближайшие результаты.

### **Результаты**

В процессе анализа было выявлено, что, на момент установления диагноза, все пациенты были старше 50 лет, из них 1 пациент - в возрасте 56 лет, 5 - в возрасте 60-69 лет, 4 - в возрасте 70-79 лет, еще 5 пациентов - старше 80. Максимальный возраст составил 88 лет, минимальный - 56, средний - 72 года. Данное заболевание у мужчин встречается редко (1 случай), болеют в основном женщины (14 случаев). Локализация опухоли на коже лица наблюдалась у 3 человек, у 6 - на коже верхних конечностей, у 5 - на коже нижних конечностей, и у 1 - на коже туловища. В 9 случаях из 15 карцинома Меркеля была диагностирована на I стадии, у 4 человек - на II, у 1 - на III, и еще у 1 - на IV. Почти все случаи болезни (14) выявлены на профосмотрах. Лечение включало хирургическое иссечение первичной опухоли, лучевую терапию и адьювантную химиотерапию, а также их комбинации. Прогрессирование метастазов в лимфатические узлы в процессе лечения было выявлено у 3 пациентов. Рецидив заболевания после проведенного радикального лечения наблюдался у 2 пациентов в области послеоперационного рубца. На данный момент 7 человек находятся в третьей клинической группе, 2 - во второй клинической группе, 1 пациент умер от основного заболевания, 5 скончались от других заболеваний.

### **Выводы**

Среди заболевших карциномой Меркеля преобладают женщины в возрасте старше 60 лет. В основном заболевание диагностируется на начальных стадиях опухолевого процесса. Важную роль в ранней диагностике карциномы Меркеля занимают ежегодные профосмотры.

Ближайшие результаты лечения в большинстве случаев носят благоприятный характер.