

Механічная жаўтуха непухліннага генезу, асацыіраваная з супутным вострым панкреатытам: клінічная, лабараторная і ультрагукавая семіётыка і клінічнае значэнне

Перажогіна Яніна Уладзіміраўна

Белорусский государственный медицинский университет, Мінск

Научный(-е) руководитель(-и) Клімук Святлана Анатол'еўна, *Белорусский государственный медицинский университет, Мінск*

Введение

Механічная жаўтуха непухліннага генезу складае да 40% усіх выпадкаў вострай хірургічнай паталогіі, а асацыіраваны панкреатыт з'яўляецца магутным чыннікам, што ўскладняе цяжэнне хваробы.

Цель исследования

Вызначыць частату і клінічнае значэнне асацыяцыі механічнай жаўтухі непухліннага генезу і вострага панкреатыта.

Материалы и методы

Рэтраспектыўнае даследванне карт 21 пацыентаў з дыягназам “Механічная жаўтуха” аддзялення хірургіі УЗ “3 ГКБ” г.Мінска, за 2015г.

Результаты

Медыяна узросту пацыентаў склала 62,9 год. Срод іх мужчын было 33,33%, жанчын 66,67%. Асноўнай прычынай ўзнікнення механічнай жаўтухі была жоўцекаменная хвароба. Паводле біяхімічных і УГ-крытэрыяў, супутны востры панкреатыт выяўляўся у 10% пацыентаў. Такія пацыенты даставерна часцей мелі большыя паказчыкі койка-дню, колькасць ускладненняў пасля РХПГ і апэратыўных метадаў лячэння.

Выводы

Наяўнасць вострага панкреатыту ў пацыентаў з механічнай жаўтухай непухліннага генезу павышае рызыку ускладненага курсу хваробы.