

"Типичная практика" использования психотропной терапии в общетерапевтических отделениях лечебных учреждений

Дегтярёва Юлия Александровна

Белорусский государственный медицинский университет, Минск

Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Романова Ирина Сергеевна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск

Введение

В Республике Беларусь доля пограничных нервно-психических расстройств, в структуре первичной заболеваемости психическими расстройствами, выросла с 78,3% в 2002 г. до 83,9% в 2013 г. по данным статистики. Всё чаще в последнее время врачи сталкиваются с так называемыми нозогениями – психогенными расстройствами, манифестирующими в связи с какими-либо соматическими заболеваниями.

Цель исследования

Изучить практику применения психотропных лекарственных средств в общетерапевтических отделениях стационаров.

Материалы и методы

Выполнен случайный набор 60 историй болезни пациентов, лечившихся в Госпитале МВД в терапевтическом, неврологическом отделениях за период октябрь - декабрь 2015 г. Проведен ретроспективный анализ и «выкопировка» данных из историй болезни пациентов, принимающих в стационаре какой-либо психотропный препарат. Средний возраст участников составил 47 лет, максимальный возраст 84 года, минимальный – 30 лет. Статистическая обработка: статистический пакет программы Microsoft Excel, 2010, Statistica 6.0.

Результаты

Из 20 историй болезни пациентов, 5 человек проходили стационарное лечение в терапевтическом отделении, 15 – в неврологическом отделении. В терапевтическом отделении только один пациент был осмотрен психиатром с диагнозом «Паническая атака» и принимал "Ладисан". Во всех остальных случаях лекарственные средства были назначены терапевтами: карбамазепин, «Ладисан», фенибут и диазепам 15 пациентам, проходившим лечение в неврологическом отделении, психотропные препараты были назначены неврологами: в 12 случаях был назначен карбамазепин, в 5 – фенибут, по 1 пациенту получали «Ладисан», «Адаптол», диазепам. В 7 случаях из 12 карбамазепин был назначен пациентом, которые имели диагноз: вертеброгенная или дискогенная радикулопатия.

Выводы

Предварительные результаты нашего исследования указывают на то, что в общесоматических отделениях стационара используются различные психотропные препараты, в частности анксиолитики, антидепрессанты, противоэпилептические средства. Существенная частота назначения их в стационаре указывает на преобладание лечения на амбулаторном этапе.