

## **Особенности клинических проявлений каплевидного псориаза**

*Горбачева Анна Сергеевна, Скребец Юлия Владимировна*

*Гомельский государственный медицинский университет, Гомель*

*Научный(-е) руководитель(-и) Порошина Лариса Александровна, Гомельский государственный медицинский университет, Гомель,*

*Печера Ирина Васильевна, Гомельский государственный медицинский университет, Гомель*

### **Введение**

Псориаз - хроническое неинфекционное заболевание, частота которого составляет от 1 до 5%. Мужчины и женщины болеют одинаково часто. Выделяют ряд концепций его развития: инфекционную, иммунологическую, генетическую, обменную, нейроэндокринную. Болезнь значительно ухудшает качество жизни, снижает работоспособность и социальную активность пациентов, что определяет медицинскую и социальную значимость проблемы.

### **Цель исследования**

Изучить частоту и причину возникновения каплевидного псориаза, особенности клинических проявлений данной патологии.

### **Материалы и методы**

Исследование проводилось на основании ретроспективного анализа амбулаторных карт пациентов, проходивших лечение в УГОККВД. Всего было обработано 320 амбулаторных карт пациентов, страдающих псориазом. Среди них у 24 пациентов был каплевидный псориаз. У пациентов с каплевидным псориазом оценивали причину и длительность заболевания, сезонность, локализации сыпи. В случаях выявления пациентов, с первичным псориазом, главную роль играет бактериальная инфекция, что определяет принципы лечения.

### **Результаты**

При анализе 320 амбулаторных карт пациентов с псориазом у 24 (7,5%) был выставлен диагноз каплевидный псориаз. Среди них было 14 пациенток женского пола (58,3%) и 10 мужского (41,7%). Минимальный возраст 5 лет, максимальный 58 лет. В возрасте до 10 - лет было 4 человека (16,7%), 11-18 лет – 6 человек (25%), 19-30 лет - 7 человек (29,1%), 31-40 лет - 4 человека (16,7%), 51-60 лет – 3 человека (12,5%). Таким образом, детей было 2/3 из общего числа пациентов. Отягощенная наследственность по псориазу была выявлена у 7 (29,2%) пациентов. Впервые выявленный псориаз был у 11 пациентов. Рецидивирующий характер заболевания выявлено у 13 человек, причем у всех их отмечался сезонный характер высыпаний, преимущественно в осенне-зимний период.

Причинами возникновения заболевания в большинстве случаев (70,8%) были инфекции. Лишь 7 пациентов не указывали на перенесенную простуду, хотя при анализе данных лабораторных исследований у 3 из них были изменения в общем анализе крови (лейкоцитоз, сдвиг лейкоцитарной формулы влево, повышение СОЭ).

Волосистая часть головы вовлекалась в процесс почти у половины пациентов (45,8%). У всех пациентов сыпь была симметричная, локализовалась на туловище и конечностях.

### **Выводы**

Каплевидный псориаз составил 7,5% в общей структуре заболеваемости псориазом. Часто каплевидный псориаз возникает как первичное проявление. Заболевание наиболее часто встречается среди детей. Наблюдается сезонность заболевания. Прослеживается заболеваемость в холодный период года.