

## **Эффективность синупрета при лечении больных с острым риносинуситом**

*Абдумаликов Исомиддин Мухаммаджон угли, Юсунов Мухаммаджон Маликович  
Андижанский Государственный Медицинский Институт, Андижан*

*Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, профессор Косимов Кобил  
Косимович, Андижанский Государственный Медицинский Институт, Андижан*

### **Введение**

Антибиотики применяемые при лечении больных с острым риносинуситом приводят к развитию микозов, подавлению иммунной системы и аллергической перестройке в организме, кроме того многие штампы микроорганизмов приобретают резистентность ко многим антибактериальным препаратом.

### **Цель исследования**

В последнее время для лечения острых риносинуситов применяются препараты растительного происхождения к таким относится синупрет.

### **Материалы и методы**

Материалы исследования: Под наблюдением находилось 107 больных с острым риносинуситом, в возрасте от 7 до 55 лет. Из 107 больных катаральная форма у 75 (70%); гнойная у 32 (30%). При лечении больных было разделено на две группы: в первую группу (70 пациентов) составили больные, которые в комплексе лечения наряду с синупретом получали антибиотики, пункция пазухи с промыванием раствора фурацилина и физиотерапия (УВЧ).

### **Результаты**

Учитывались на основании эндоскопического осмотра полости носа, субъективной оценки своего состояния самим пациентам и при необходимости контрольная рентгенография околоносовых пазух. В основной группе где больные получали синупрет клиническое улучшение, состояние наблюдались уже на 2 день лечения, тогда, как в контрольной группе эти улучшения наступили на 4-5 сутки. После лечения больных наблюдали в течение года. За этот период не было отмечено ни одного рецидива в основной группе, а во второй группе у 2 больных отмечено рецидив заболевания.

### **Выводы**

Применение синупрета в комплексе лечения больных с острым риносинуситом является достаточно эффективным средством. У больных с острым риносинуситом применение синупрета приводит к быстрому улучшению состояния больного, резко сокращает число рецидивов заболевания.