

Мазурина М. Д.

СИНДРОМ БЮРО-БАРРЬЕРА

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Белугина И. Н.

Кафедра кожных и венерических болезней

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск

Цель работы – ознакомление с наблюдавшимися нами клиническими случаями.

Методика исследования - проведение статистического анализа ретроспективной выборки 5 пациентов.

Результаты: синдром Бюро-Баррьера – деформирующая псевдосирингомиелитическая язвенно-мутилирующая акропатия. При этом заболевании клинически наблюдается деструктивный процесс с поражением кожи и костной ткани вследствие приобретенной одно- или двухсторонней полинейропатии. В патогенезе синдрома важную роль играет хроническая алкогольная интоксикация, а предрасполагающими факторами выступают локальное повреждение ног, сахарный диабет, болезни печени, ношение тесной обуви, хроническая травматизация стоп, гиповитаминозы, ожирение, дисплазии спинного мозга. Этот синдром встречается преимущественно у мужчин среднего возраста (40-60 лет), чаще поражаются обе нижние конечности.

Выводы: синдром Бюро-Баррьера сравнительно редко регистрируется в Беларуси. Учитывая редкость описания болезни и частоту диагностических ошибок дерматовенерологов при первичном обращении больных (в трех из пяти случаев при первом обращении к дерматовенерологу диагноз синдрома Бюро-Баррьера не был поставлен, причем двое из этих пациентов вначале обращались к хирургу по месту жительства и получали неэффективное лечение по данному диагнозу).