

Зуськова Е. С., Базис В. Р.

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ И ФАКТОРЫ РИСКА РЕЦЕССИИ ДЕСНЫ У ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

*Научные руководители: канд. мед. наук, доц. Минченя О. В.,
канд. мед. наук Бурак Ж. М.*

*Кафедра стоматологии детского возраста
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск*

Актуальность. Рецессией десны называют невоспалительное заболевание тканей маргинального периодонта, которое характеризуется смещением краевой десны в апикальном направлении. Убыль десны негативно влияет на эстетику лица и, как результат, на психологическое состояние человека. Проблема рецессии десны у детей продолжает оставаться малоизученной.

Цель: изучить распространенность рецессии десны у детей и подростков с выявлением факторов, способствующих ее развитию.

Задачи:

1 изучить распространенность рецессии десны у школьников в возрасте 6-16 лет.

2 изучить факторы риска рецессии десны у детей школьного возраста.

Материалы и методы. Проведено стоматологическое обследование 461 школьника в возрасте 6-16 лет. Обследование детей проводили в условиях школьного стоматологического кабинета. Состояние тканей периодонта оценивали с помощью визуальных методов. Обследование детей включало диагностику факторов риска развития рецессии десны: оральная ауто травма, состояние функции глотания, особенности архитектоники полости рта, состояние прикуса. Для статистической обработки результатов исследования использовали методы, принятые в медицине.

Результаты и их обсуждение. Среди обследованных школьников доля лиц с рецессией десны составила 3,7% (17 человек). У школьников в возрасте 6-8 лет рецессия десны не обнаружена. Среди детей с рецессией десны выявлены факторы риска, способствующие ее развитию: нарушение техники чистки зубов у 10 (58,82%) детей; нарушение функции глотания у 5 (29,41%) школьников; недостаточная высота прикрепленной десны у 11 (64,71%) детей; патология прикуса у 10 (58,82%) детей школьного возраста.

Выводы:

1 среди обследованных школьников в возрасте от 6 до 16 лет распространенность рецессии десны составила 3,7%.

2 установлены факторы риска рецессии десны у детей школьного возраста, среди которых наиболее часто рецессия десны сочеталась с недостаточной высотой прикрепленной десны (64,71%), нарушением техники чистки зубов (58,82%) и патологией прикуса (58,82%).