

*Онищенко Н. В.*

## **КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЕТРЯНОЙ ОСПЫ У ВЗРОСЛЫХ**

*Научный руководитель д-р мед. наук, проф. Рябоконт Е. В.*

*Кафедра инфекционных болезней*

*Государственный медицинский университет, г. Запорожье*

**Актуальность.** Необходимость изучения проблемы ветряной оспы определяется ростом уровня заболеваемости среди взрослых, тяжелым течением заболевания, риском развития тяжелых осложнений и летальных исходов. Летальность при ветряной оспе у взрослых в 10-20 раз выше, чем у детей.

**Цель:** изучить клинико-эпидемиологические особенности течения ветряной оспы у взрослых по данным Запорожской областной инфекционной клинической больницы.

**Материал и методы.** Проанализировано 176 историй болезни больных, от 18 до 45 лет, госпитализированных с диагнозом «ветряная оспа». Всем больным проводились традиционные клинико-лабораторные исследования. Диагноз устанавливался на основании клинико-эпидемиологических данных.

**Результаты и их обсуждение.** Среди госпитализированных больные молодого возраста составили 74,4%, из них мужчин – 77,3%. На прямой контакт с больными ветряной оспой указали 75,4% больных. Среди госпитализированных преобладали больные из организованных коллективов 87,8%. Зарегистрирована зимне-весенняя сезонность 73,3%. Среди больных преобладало средне-тяжелое течение заболевания – 95,4%. Легкое и тяжелое течение регистрировались по 2,3% соответственно. Тяжелое течение развивалось у больных в возрасте 35-45 лет. У большинства больных заболевание имело острое начало – 68,2%. Продромальный период зарегистрирован у 31,8% больных. Период высыпаний характеризовался полиморфизмом и сопровождался повышением температуры тела. У 50,6% больных наблюдалась ранняя пустулизация с более длительной лихорадкой и развитием стрептодермии у 6,3%. Появление сыпи у 69,9% больных сопровождалась появлением энантемы и увеличением лимфатических узлов. У 11,9% больных заболевание протекало на фоне различной сопутствующей патологии. Осложнения развивались у 20,2% больных со среднетяжелым и у всех с тяжелым течением. У всех больных с тяжелым течением развивалось по несколько осложнений. Изменения в общем анализе крови определялись тяжестью течения заболевания и характером осложнений.

### **Выводы:**

- 1 Среди больных преобладали лица молодого возраста 74,4%, мужчины 73,3%.
- 2 Тяжелое течение ветряной оспы наблюдалось у 2,3% больных в возрасте 35-45 лет.
- 3 У 50,6% заболевание сопровождалось ранней пустулизацией с более продолжительным повышением температуры.