

*Ткаченко Д. В., Кукса А. О.*

## **КОСМЕТИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ ФАЦИАЛЬНОЙ ВИЧ-АССОЦИИРОВАННОЙ ЛИПОАТРОФИИ**

*Научные руководители канд. мед. наук, доц. Меркулава Н. Ф.,  
канд. мед. наук, доц. Ткаченко С. Г.*

*Кафедра инфекционных болезней, кафедра дерматологии, венерологии и  
медицинской косметологии*

*Харьковский национальный медицинский университет, г. Харьков*

Фациальная липоатрофия – это часть синдрома, который наблюдается у ВИЧ-позитивных пациентов, получающих лечение антиретровирусными препаратами и характеризуется прогрессирующей потерей подкожно-жирового слоя в области щек и глубокими носогубными складками, что придает человеку изможденный вид. В классификации течения данного заболевания различают 4 степени тяжести (по James), которые клинически проявляются прогрессирующей потерей подкожного жира лица и увеличением зон поражения. Значимость данному заболеванию придает не только выраженное ухудшение внешнего облика пациента, но и психологического и социального здоровья, что может привести к неадаптивности пациентов к антиретровирусной терапии и усугублению социальной изоляции.

Основным методом косметической коррекции фациальной ВИЧ-ассоциированной липоатрофии является аугментация мягких тканей, или контурная и объемная пластика, что представляет собой совокупность инъекционных методик, направленных на восстановление объема тканей лица, увеличение толщины кожи и устранение морщин. Препараты, которые используют в данной методике, называются дермальными филлерами, кожными наполнителями и микроимплантами. На данный момент существует 2 препарата, одобренных FDA: поли-L-молочная кислота и кальция гидроксапатит. В результате проведенного лечения пациенты отмечали не только улучшение своего внешнего вида, но и эмоционального состояния и социального статуса, что вернуло им уверенность в себе. В настоящее время, для коррекции данного заболевания используют также гель полиалкиламида и гиалуроновую кислоту, однако, их применение пока официально не одобрено FDA в силу их новизны.

Изучение вопроса о влиянии косметических процедур на социальное и психологическое здоровье пациентов показало, что на данный момент лишь единичные исследования фокусируются не нехирургических косметических процедурах и косметическом уходе. Необходимо больше исследований для оценки влияния различных косметических процедур на чувство собственного достоинства, уверенность, отношения и признание в обществе. Будущие исследования должны также сосредоточиться на развитии и стандартизации практических, действенных и надежных инструментов оценки результатов качества жизни у пациентов в медицинской косметологической практике.