

## **Ретрохориальные гематомы и их влияние на исход беременности и родов**

**Стефанович Вера Тадеушевна**

*Белорусский государственный медицинский университет, Минск*

**Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, Никитина Елена**

**Валентиновна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск**

### **Введение**

Одной из наиболее актуальных проблем современного акушерства являются репродуктивные потери. Недоношенность и ее осложнения являются основной причиной смертности плодов и новорожденных без аномалий развития и составляют 70% от общей перинатальной смертности. Одним из симптомов самопроизвольного прерывания беременности является кровотечение и образование ретрохориальной гематомы.

### **Цель исследования**

В данном исследовании проводился сравнительный анализ гестационного периода у женщин с ретрохориальной гематомой и без нее.

### **Материалы и методы**

Проводилось изучение историй болезни беременных женщин, находившихся на лечении в гинекологическом отделении УЗ «6 ГКБ» по поводу ретрохориальной гематомы, а также истории родов пациенток этой группы, родоразрешение которых происходило в роддоме 6 ГКБ. Анализировалось наличие факторов риска самопроизвольного прерывания беременности, степень отслойки, ее клиника и другие факторы, которые могли повлиять на исход беременности. Полученные данные обрабатывались статистически.

### **Результаты**

Проведенное исследование показало наличие у большинства женщин исследуемой группы сдвигов в коагулограмме. Пациентки этой группы чаще подвергались внутриматочным манипуляциям и имели отягощенный акушерско-гинекологический анамнез (хирургический аборт, выкидыш, неразвивающаяся беременность и т.д.). Основными жалобами при поступлении в стационар были боли внизу живота и кровянистые выделения из половых путей. Наличие ретрохориальной гематомы было подтверждено при УЗИ-исследовании. У женщин исследуемой группы 38% родов были преждевременными, вес 47% новорожденных детей был меньше 3000 г. Больше половины родов исследуемой группы имели акушерские осложнения.

### **Выводы**

Кровотечение и образование ретрохориальной гематомы – признак самопроизвольного прерывания беременности. Ретрохориальные гематомы являются фактором, предрасполагающим к развитию таких осложнений в родах, как акушерские кровотечения, преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты; рождению маловесных детей.