

Состояние иммунного ответа при урогенитальной инфекции у беременных женщин

Комарова Юлия Юрьевна

Белорусский государственный медицинский университет, Минск

Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, научный сотрудник

Савицкая Валентина Михайловна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск

Введение

Одной из главных проблем невынашивания беременности является урогенитальная инфекция. Частота ее распространения остается стабильно высокой на всех континентах мира. Урогенитальная инфекция негативно воздействует на самые различные органы и системы, и в первую очередь половую систему, приводит к развитию бесплодия, других репродуктивных нарушений и реактивных патологических процессов.

Цель исследования

Изучить состояние иммунитета, особенности течения беременности и родов у женщин с урогенитальной инфекцией.

Материалы и методы

Для решения поставленных задач была использована учебная и научная литература. За период 2015-2016 г. проведено комплексное клиничко-лабораторное обследование 45 беременных с генитальной инфекцией на базе УЗ "1-я городская клиническая больница» г. Минска. Проведен анализ исходной клинической характеристики, особенностей течения беременности и родов. Проводились общеклинические, лабораторные, функциональные методы исследования.

Результаты

На основании полученных данных было выявлено, что заболевания урогенитальной системы у беременных женщин отягощают гестационный процесс: частота самопроизвольных выкидышей или неразвивающихся беременностей и преждевременных родов составляет 67%, что свидетельствует о несомненной роли инфекции как отягощающего фактора при данных видах патологии и согласуется с работами многих исследователей. На основании литературных данных изучены прогностические маркеры осложнения беременности при урогенитальной инфекции. С помощью данных маркеров можно выработать дальнейшую тактику ведения беременности и прогнозировать преждевременные роды.

Выводы

Женщин с инфекциями урогенитальной системы целесообразно выделять в группу риска по развитию осложнений беременности. Активация иммунного ответа при инфекциях беременных является причиной невынашивания беременности и других осложнений. Выявлены прогностические маркеры осложнения беременности при урогенитальной инфекции.