

Казимиренко Д. В.

СРАВНЕНИЕ МЕТОДИК ПОВТОРНОГО ПРОТЕЗИРОВАНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ПОЛНОЙ ПОТЕРЕЙ ЗУБОВ ПРИ ПОМОЩИ ЖЕВАТЕЛЬНЫХ ПРОБ

Научный руководитель ассист. Пискур В. В.

Кафедра ортопедической стоматологии

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск

Актуальность. Высокая распространенность полной потери зубов среди населения. Трудности изготовления протезов, полноценных в функциональном и эстетическом отношении. Высокая доля лиц, обращающихся за повторным протезированием и необходимость изготовления качественных протезов при повторном протезировании.

Цель: сравнить эффективность двух методик изготовления ПСПП при повторном протезировании пациентов с полной потерей зубов.

Задачи:

- 1 Провести жевательные пробы до протезирования и в различные сроки после протезирования у пациентов с полной потерей зубов.
- 2 Оценить показатели жевательных проб для двух методик, а именно:
 - время жевания
 - индекс жевания
 - жевательная эффективность

Материал и методы. Произведено обследование пациентов, обратившихся с целью повторного протезирования в РКСП. Повторное протезирование данных пациентов с помощью двух методик: методика дублирования и по стандартной методике. Оценка эффективности методик с использованием жевательных проб.

Результаты и их обсуждение. Данные функциональных (жевательных) проб по стандартной методике:

Жевательная эффективность до лечения составила 36,12-53,71

Через 2 года 44,26-64,17

Данные функциональных (жевательных) проб по методике дублирования:

Жевательная эффективность до лечения составила 40,08-62,40

Через 2 года 52,34-69,84

Выводы:

1 На основании проведенного нами исследования можно сделать вывод о преимуществах методики дублирования по сравнению со стандартной методикой изготовления ПСПП, что прослеживается при анализе всех показателей жевательных проб.

2 Необходимо более широкое применение метода дублирования в практическом здравоохранении, что позволит повысить эффективность повторного протезирования пациентов с полной потерей зубов.