

Рамизовская А. А.

ПОЗДНЯЯ ГЕМОРРАГИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ НОВОРОЖДЕННЫХ. НЕОБХОДИМОСТЬ ПРОФИЛАКТИКИ

Научный руководитель канд. мед. наук, ассист. Якимович Н. И.

Кафедра 1-я детских болезней

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск

Актуальность. Известно, что одной из причин развития внутричерепных кровоизлияний у детей первых месяцев жизни является поздняя геморрагическая болезнь новорожденного. Предвидеть развитие позднего дебюта невозможно, поэтому профилактика ГрБН чрезвычайно важна.

Цель: проанализировать факторы риска развития поздней геморрагической болезни новорожденных, определить способы профилактики и лечения данной патологии.

Задачи:

1 Провести ретроспективный анализ историй болезни детей, госпитализированных в УЗ «ГДИКБ г. Минска».

2 Выделить факторы риска развития поздней геморрагической болезни и тяжелых осложнений.

Материал и методы. Проведён ретроспективный анализ историй болезни 6 детей, поступивших для лечения в УЗ «ГДИКБ г. Минска» в 2009 – 2014 гг. по поводу поздней ГрБН. Проанализированы результаты лабораторных данных, лечение ГрБН, а также жалобы и симптоматика при данной патологии. Проведен анализ полученных результатов с данными литературного обзора.

Результаты и их обсуждение. Средний возраст детей, перенесших позднюю геморрагическую болезнь составил 1 месяц 9 дней. Были выявлены такие, наиболее часто встречающиеся факторы риска развития данной патологии, как осложнения течения беременности (75%), осложнения родов (50%), прием новорожденными антибиотиков (25%). Среди жалоб, предшествовавших появлению геморрагий или кровотечений, наиболее часто были отмечены: срыгивание (50%), беспокойство ребенка (75%), изменения стула (50%), бледность (50%), наличие субфебрильной температуры (25%). Далее были проанализированы данные лабораторных исследований и проведенное лечение. Полученные результаты соотнесены с литературными данными.

Выводы:

1 Факторами риска развития поздней геморрагической болезни новорожденных являются: осложнения течения беременности и родов, прием антибиотиков и т.д.

2 Проведение профилактики ГрБН является наиболее значимой мерой предотвращения тяжелых осложнений поздней геморрагической болезни.