

*Зданкевич И. И.*

**ВЛИЯНИЕ РАННЕГО ТОКСИКОЗА  
НА ТЕЧЕНИЕ И ИСХОД БЕРЕМЕННОСТИ**

*Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Вербицкая М. С.*

*Кафедра акушерства и гинекологии*

*Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск*

**Актуальность.** Ранний токсикоз – это довольно распространенное осложнение беременности (22-28%). Несмотря на проведенные многочисленные исследования, найти его истинную причину до сих пор не удалось. Процессы, происходящие в организме женщины на ранних сроках беременности, связанные с закладкой и развитием всех органов и систем плода, имеют большое значение для исхода беременности и здоровья матери и новорожденного.

**Цель:** Изучить влияние раннего токсикоза на течение и исход беременности.

**Материалы и методы.** В ходе исследования на базе архива УЗ «1-я городская клиническая больница» были проанализированы истории болезней и родов 80 женщин. Все они были разделены на 2 группы: 1-я – 40 женщин, беременность которых осложнилась ранним токсикозом, 2-я – 40 женщин, беременность которых протекала без осложнений. Средний возраст беременных в 1-ой группе составил  $26,7 \pm 0,3$  года, во 2-ой –  $24,8 \pm 0,6$  года.

**Результаты и их обсуждение.** Анализ анамнестических данных показал, что по возрасту и социальному статусу беременные групп сравнения существенно не различались. При оценке акушерско-гинекологического анамнеза было установлено, что в 1-ой группе чаще встречались женщины с отягощенным акушерским анамнезом и сопутствующими гинекологическими заболеваниями. Ранний токсикоз в основном встречался в легкой или средней степени тяжести. Изучая течение родов у пациенток данных групп, нами отмечено, что у женщин 1-ой группы роды чаще осложнялись несвоевременным излитием околоплодных вод, аномалией родовой деятельности и гипоксией плода в родах, что в 30 % случаев приводило к оперативному родоразрешению.

**Выводы.** Отягощенный акушерский анамнез и сопутствующие гинекологические и соматические заболевания являются факторами риска развития токсикоза в первой половине беременности. У рожениц с токсикозом первой половины беременности в анамнезе выше риск осложнений в родах через естественные родовые пути (преждевременное излитие околоплодных вод, гипоксия плода) и оперативного родоразрешения по сравнению с контрольной группой.