

Ткачев Е. А., Логунович А. А.
**ВЗАИМОСВЯЗЬ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА
С ПАТОЛОГИИ ЦНС У ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ**
Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Назаренко О. Н.

*Кафедра пропедевтики детских болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск*

Цель: настоящим исследованием явилось изучение различных социальных, акушерских, медицинских факторов риска развития патологии ЦНС, с выделением наиболее значимых.

Задачи:

1 Оценить влияние некоторых социальных факторов риска на развитие патологии ЦНС, у детей первого года жизни.

2 Изучить данные акушерского анамнеза, характера течения беременности, родов, у детей с наличием патологии ЦНС и без таковой.

Материал и методы. С помощью разработанной нами анкетой, проведено анкетирование матерей, медицинского персонала, 42 пациентов первого года жизни (26 без патологии ЦНС –I группа; 16 наблюдаемых у невропатолога в течении жизни –II группа). Изучены данные амбулаторных карт указанных детей, с учетом обменных карт из роддома и дальнейшим наблюдением на участке.

Результаты и их обсуждение. Оценка различных социальных параметров, показало что наиболее значимой для развития патологии ЦНС явился возраст матери старше 30 лет, у детей группы II, такой возраст составил 50,0%, а группа I-23,0 %, и образование матерей- высшее чаще наблюдалось в группе II. Мы не выявили существенных различий в частоте встречаемости развития патологии ЦНС, от полной неполной семьи, возраста отца, вредных привычек, а также от характера вскармливания. Наиболее важные результаты получены при оценки акушерского анамнез. Установлена существенно более высокая частота, отягощенного генеалогического анамнеза 75,0% в группе II, 38,46 в первом. Угрозы прерывания беременности 43,7%в группе II, 26,9% в I группе. Состояние экстрагенитальной патологии и в особенности интеркуррентных заболеваний во время беременности, более высокая частота поражений ЦНС отличалось на фоне патологии родов.

Выводы:

1 Установление наиболее существенных факторов риска патологии ЦНС, позволило проявлять осторожность и своевременное консультированное невропатолога у данного контингента больных.