

**Комиссаров К. С.**  
**ПСИХОЗ, ВЫЗВАННЫЙ КУРИТЕЛЬНЫМИ СМЕСЯМИ**  
**Научный руководитель д-р мед. наук, доц. Копытов А. В.**  
*Кафедра психиатрии и медицинской психологии*  
*Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск*

**Актуальность.** С 2009 года во многих странах Европы резко увеличилось количество случаев отравления так называемыми «курительными смесями». В 2012 году подобный процесс затронул и Беларусь, а курительные смеси приобрели статус новой социальной угрозы. В 2010 году Американская ассоциация психиатров выступила с предложением о выделении психоза, вызванного потреблением курительных смесей, в отдельную нозологическую единицу.

**Цель:** описать изменения психического статуса у потребителей курительных смесей

**Задачи:**

- 1 Проанализировать состояние больных поступающих в приёмное отделение после отравления курительными смесями.
- 2 Провести анкетирование больных, проходящих медико-психологическую реабилитацию, с целью оценки изменений их психического статуса.

**Материал и методы.** Медицинские карты 125 стационарных пациентов, проходивших лечение в УЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи» с диагнозом «Отравление психоактивным веществом неуточнённым» за период 2012-2013 гг. На основании данных документов было описано состояние пациентов на момент госпитализации. Для оценки психического статуса использовались опросники: SCL-90, модифицированный опросник на алкомотивы, опросник для определения акцентуации личности. Анкетирование проводилось среди пациентов РНПЦ психического здоровья. Данные были обработаны при помощи пакета программ Statistica 7.0

**Результаты и их обсуждение.** Средний возраст госпитализируемых пациентов составил  $20,76 \pm 4,62$  лет (максимальный — 35, минимальный — 15 лет). В оцениваемой выборочной совокупности мужчины составили 89,7%. В 39,2% случаев отмечалась потеря сознания и амнезии, кроме того, в 28% случаев пациенты были доставлены в приёмный покой в состоянии возбуждения. В отдельных случаях (11,2%) пациенты предъявляли жалобы на зрительные и слуховые галлюцинации, чувство страха смерти. В 36,8% к продуктивному контакту способны не были.

**Выводы:**

- 1 Курительные смеси несут большую угрозу здоровью их потребителя.
- 2 Для острого отравления курительными смесями характерно состояние двигательного возбуждения, потери памяти. При высоких дозах интоксикантов – угнетение сознания вплоть до комы.