

Каминский А.

**КЛИНИЧЕСКИЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА
« ГИАЛУОСТ№1» ПРИ ЛЕЧЕНИИ ДЕСТРУКТИВНЫХ ФОРМ
ХРОНИЧЕСКОГО АПИКАЛЬНОГО ПЕРИОДОНТИТА**

Научный руководитель ассист. Захарова И. А.

2-я кафедра терапевтической стоматологии

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск

Актуальность. По данным отечественных исследователей распространенность осложнений кариеса зубов высока и составляет 93,2% (Е.В. Боровский 1998). Пациенты с различными формами периодонтитов составляют 30-35% от общего числа посещений на терапевтическом приеме. Цель лечения апикального периодонтита - ликвидация воспаления в периапикальных тканях, исключение патогенного влияния на организм одонтогенного воспалительного очага, регенерация тканей периодонта и восстановление функции зуба. В настоящее время наиболее широко для восстановления костной структуры применяются две группы препаратов: на основе кальция гидроксида и гидроксиапатита кальция.

Цель: оценка клинической эффективности препарата «Гиалуост№1» для лечения деструктивных форм хронического апикального периодонтита.

Материал и методы. Было проведено обследование и лечение пациента М. с периапикальным абсцессом без свища в зубе 46. Эндодонтическую обработку корневых каналов проводили ручным методом с использованием ЭДТА – содержащих препаратов и медикаментозной обработкой 0,06% раствором хлоргексидина. Далее проводилась пломбировка корневых каналов в зубе 46 препаратом «Гиалуост№1». Рентгенологический контроль проводился через 1 и 3 месяца. Через 3 месяца проведена постоянная пломбировка гуттаперчевыми штифтами методом латеральной конденсации с силлером «Adseal» и последующей реставрацией коронки зуба.

Результаты и их обсуждение. Об эффективности лечения судили на основании данных клинического и рентгенологического контроля. Ближайшие результаты были расценены как благоприятные. У пациента через 3 месяца наблюдалось восстановление костной структуры в области очага.

Выводы:

1 Консервативное лечение периапикального абсцесса без свища с использованием препарата «Гиалуост №1» приводит к регенерации костной ткани за небольшой срок.

2 Качественное эндодонтическое лечение с временным пломбированием препаратом «Гиалуост» деструктивных процессов в апикальном периодонте позволяют сохранить зубы, подлежащие удалению.