

Плеско Т. С., Годун О. В.
**ПРОБЛЕМЫ ЛЕЧЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА У ПАЦИЕНТОВ
С ВИРУСНЫМИ ГЕПАТИТАМИ**

Научный руководитель ассист. Антонова Н. П.

Кафедра фтизиопульмонологии

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск

Актуальность. Длительный и непрерывный прием противотуберкулезных препаратов, помимо лечебного эффекта, нередко оказывает отрицательное воздействие на организм человека. Установлено, что больные туберкулезом легких с сопутствующими протекающими хроническими вирусными гепатитами являются группой риска по развитию побочных реакций.

Задачи:

1. Определить сроки наиболее высокого риска развития гепатотоксических реакций.
2. Изучить распространенность гепатотоксических реакций у пациентов с туберкулезом легких и хроническим вирусным гепатитом.
3. Изучить распространенность гепатотоксических реакций у пациентов с туберкулезом легких и вирусным гепатитом в анамнезе.

Материал и методы. Поведен ретроспективный анализ 1170 историй болезни пациентов с туберкулезом легких, завершивших курс лечения в 2012-2014 годах и историй болезни умерших пациентов в 2011 -2014 годах.

Результаты и их обсуждение. Хронический вирусный гепатит имел место у 4,8% (56 пациентов), сходное количество пациентов за этот период имели гепатит в анамнезе 5,6% (66 пациентов). Проанализировав, частоту побочных реакций в различных группах можно отметить, что у пациентов с хроническим вирусным гепатитом гепатотоксические реакции встречаются достоверно чаще (10,4%), чем у пациентов без патологии печени (4,3%) ($p < 0,05$), а наличие гепатитов в анамнезе значительно не ухудшает переносимость противотуберкулезных препаратов. Гепатотоксические реакции наиболее часто развивались на 1 месяце лечения. В большинстве случаев применения дезинтоксикационной терапии и гепатопротекторов позволило продолжить полноценный курс лечения туберкулеза, необходимость в отмене противотуберкулезных препаратов по причине развития клиники тяжелых гепатитов имела место только у пациентов с хроническими вирусными гепатитами.

Выводы:

- 1 ПЭ наиболее часто развиваются у пациентов на первом месяце лечения туберкулеза
- 2 Переносимость ПТП в группе пациентов с гепатитами в анамнезе статистически значимо не отличается от пациентов, не имевших патологии печени.