

Шерневич Ю.И., Пильгун А.С.
ОЦЕНКА РИСКА КРОВОТЕЧЕНИЙ ИЗ ЛОР ОРГАНОВ
Научный руководитель: д-р. мед. наук, доц. Сакович А. Р.

Кафедра болезней уха, горла, носа

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск

Актуальность. Кровотечения различной степени могут возникать во время проведения хирургических вмешательств на ЛОР органах или как симптоматическое проявление соматических заболеваний и травм.

Цель: установить причины возникновения носовых кровотечений, интенсивность (степень выраженности), методы остановки.

Материалы и методы. Для получения необходимой информации было проанализировано 53 истории болезни пациентов с проявлениями кровотечений за 2016 г. (май – июль), - из них мужчин - 32, женщин - 21. Средний возраст пациентов 41,3 года, в том числе мужчин – 41,4, а женщин – 41,1 год.

Результаты и их обсуждение.

По данным проведенного анализа было установлено, что все 53 случая кровотечений из ЛОР-органов за исследованный период были кровотечениями из носа и околоносовых пазух. Кровотечения, связанные с соматической патологией (заболевания сердечно-сосудистой системы) имели место в 8 случаях (15,1 %), из них мужчин - 2, женщин - 6.

Кровотечения, не связанные с соматической патологией, наблюдались у 45 пациентов (84,9 %), в том числе мужчин – 30, женщин – 15. В одном случая кровотечение возникло вследствие травмы (закрытый перелом костей носа). Остальные случаи связаны с выполнением хирургических вмешательств, наиболее часто – по поводу искривления перегородки носа, - 32 случая (60,4 % от всех случаев кровотечений).

По интенсивности (степени выраженности) кровотечение определено как: выраженное (обильное) – 6 случаев, умеренное - 46, незначительное - 1. Всем пациентам выполнена передняя тампонада носа, которой во всех случаях было достаточно для эффективной остановки кровотечения, а также проводилось консервативное лечение.

Выводы.

Проанализировав полученные данные был сделан вывод, что средний возраст пациентов в ЛОР-отделении с кровотечением из носа и околоносовых пазух составил 41 год.

Кровотечения наиболее часто связаны с хирургическими вмешательствами в полости носа и пазух (83,0 %), в том числе по поводу искривления перегородки носа 60,4 %. В результате соматических заболеваний, сопровождающихся кровотечением из носа, за проанализированный период времени число обращений за медицинской помощью было небольшим (8 случаев). По интенсивности в большинстве случаев кровотечение из носа определено как умеренное, - 46 случаев (86,8 %).

Остановку кровотечения производят путем выполнения передней тампонады носа, которая является стандартным и эффективным методом, наряду с медикаментозным лечением, включающим гемостатики и препараты для лечения болезней сердца и сосудов, как основной соматической патологии, часто сопровождающейся носовыми кровотечениями.