

*Уласевич И. В.*

## **ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ СРОЧНОЙ СЛУЖБЫ ОСТРЫМИ КИШЕЧНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ**

*Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Мощик К. В.*

*Кафедра военной эпидемиологии и военной гигиены*

*Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск*

**Актуальность.** Острые кишечные инфекции (ОКИ) относятся к числу весьма значимых для воинских контингентов инфекционных заболеваний, что обуславливает актуальность их эпидемиологического изучения.

**Цель:** эпидемиологический анализ заболеваемости военнослужащих срочной службы Вооруженных Сил РБ ОКИ за период с 2004 года.

**Задачи:**

- 1 Анализ и оценка многолетней динамики заболеваемости ОКИ.
- 2 Анализ и оценка годовой динамики заболеваемости ОКИ.

**Материал и методы.** Источником исходной информации для проведения исследования служили сводные данные учетно-отчетной медицинской документации – форма 3/мед (медицинский отчет за год с объяснительной запиской). Методы исследования: статистические; методика определения военно-эпидемиологической значимости отдельных заболеваний или групп болезней.

**Результаты и их обсуждение.** Заболеваемость военнослужащих ОКИ характеризовалась чередованием неравномерных по продолжительности периодов роста и снижений ее показателей с умеренной общей тенденцией к снижению. Для годовой динамики заболеваемости была типична присущая ей сезонность, выражавшаяся значительной интенсификацией эпидемического процесса кишечных инфекций в летние и осенние месяцы. Общая продолжительность подъема заболеваемости составляла свыше 4 месяцев, а ее пик наблюдался в сентябре-октябре.

На уровни заболеваемости военнослужащих ОКИ существенно влияли возникавшие в отдельных воинских частях и учреждениях вспышки этих заболеваний. К основным причинам групповой заболеваемости ОКИ следует отнести нарушения санитарно-гигиенических требований в процессе приготовления пищи, а также при доставке готовой пищи от кухонь к местам раздачи.

Факторами, способствовавшими возникновению заболеваемости ОКИ, являлись неудовлетворительное санитарно-гигиеническое состояние объектов питания и нарушения условий хранения пищевых продуктов.

**Выводы:**

1 На протяжении периода наблюдения заболеваемость военнослужащих срочной службы ОКИ характеризовалась умеренной многолетней эпидемической тенденцией к снижению.

2 В годовой динамике заболеваемости ОКИ наблюдалась летне-осенняя сезонность со средней продолжительностью периода подъема немногим более 4 месяцев.