## **Рачко Е. М., Максимович Д. А. AVORTEMENT A RISQUE**

## Научный руководитель ст. преп. Менжинская А. В.

Кафедра иностранных языков Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск

L'avortement se définit comme l'interruption avant son terme du processus de gestation, c'est-à-dire du développement qui commence à la conception par la fécondation d'un ovule par un spermatozoïde formant ainsi un œuf, qui se poursuit par la croissance de l'embryon, puis du fœtus, et qui s'achève normalement à terme par la naissance d'un nouvel individu de l'espèce. L'histoire de l'avortement remonte selon l'anthropologie à l'Antiquité. Pratiqué dans toutes les sociétés, les techniques (herbes abortives, utilisation d'objets tranchants, curetage, application d'une forte pression abdominale) et les conditions dans lesquelles l'avortement a été réalisé ont changé dans les pays où est reconnu le droit à l'avortement mais il demeure un fait de société.

Il existe deux types d'interruption volontaire de grossesse, soit l'avortement médical et l'avortement chirurgical. L'interruption médicale peut avoir lieu entre 5 à 7 semaines de gestation. L'intervention chirurgicale est pratiquée entre 5 à 23 semaines de grossesse, tout dépendant du lieu de pratique de l'intervention. Tous les pays sont divisés en groupes où 1)Une interdiction totale, sans exception. 2) Une interdiction totale sauf pour des cas exceptionnels. 3) L'avortement thérapeutique et dans d'autres cas exceptionnels. 4) L'avortement médical et socio-économiques le permettent. 5) La liberté de l'avortement.

L'avortement est une manipulation difficile, qui a beaucoup de complications.

- 1 19–20 millions d'avortements à risque (AAR) sont pratiqués par an
- 2 68 000 femmes meurent chaque année
- 3 Causes des décès : hémorragie, infection, et intoxication aux abortifs
- 4 La cause fondamentale de cette pandémie globale est la paresse, et le dédain vis à vis des femmes; celles ci souffrent et meurent parce qu'elles ne sont pas valorisées.