

Степанова Е. В.

ТУБЕРКУЛЕЗ С ШИРОКОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ В РБ

Научные руководители: ст. преп. Горбич О. А.,

н. с. отдела ФОМО Климук Д. А.

Кафедра эпидемиологии,

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск,

РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии, г. Минск

Актуальность. Туберкулез остается приоритетной проблемой для систем здравоохранения большинства стран мира. Несмотря на достигнутые мировым сообществом положительные результаты в борьбе с туберкулезом, остается достаточное количество нерешенных на сегодняшний день проблем, в первую очередь – растущий с каждым годом уровень распространения туберкулеза с лекарственной устойчивостью.

Цель: установить закономерности распределения заболеваемости туберкулезом с широкой лекарственной устойчивостью среди разных возрастных групп населения Республики Беларусь.

Задачи:

1 Определить возрастную и половую структуру лиц, больных туберкулезом с широкой лекарственной устойчивостью.

2 Выявить группы риска исходя из данных групп первичной регистрации.

Материал и методы. В настоящее исследование включено 609 человек в возрасте от 6 до 84 лет с диагнозом «Туберкулез» с установленной широкой лекарственной устойчивостью, зарегистрированных в государственном электронном регистре «Туберкулез» в 2013-2014 годах. Медиана возраста составила 44,0 лет (25–75 процентиля 34,0–53,0 лет). Количество мужчин среди включенных в исследование пациентов было 515 человек (84,564%), женщин – 94 человек (15,436%). Диагноз устанавливался на основании клинических, лабораторных и эпидемиологических критериев. Обработка данных и анализ результатов исследования были проведены с использованием программы IBM SPSS Statistics 19.0 (StatSoft®, США).

Результаты и их обсуждение. В ходе проведенного исследования было установлено, что туберкулез с широкой лекарственной устойчивостью чаще регистрировался у мужчины в возрастной группе 31–60 лет (их доля в 2013 году составила 73,4%, в 2014 году – 66,7%), которые имели в анамнезе 1 или 2 случая неэффективного лечения туберкулеза (в 2013 г. их доля составила 30,4%, в 2014 году – 35,7%, соответственно).

Выводы: Группой риска по развитию туберкулеза с широкой лекарственной устойчивостью являлись мужчины трудоспособного возраста, имевшие в анамнезе случаи неэффективной терапии данной нозологической формы.