

Нуритов А. И.

ТЕНДЕРНЫЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт, Узбекистан

Злокачественные новообразования являются серьезной проблемой современности, включающей медицинские, социальные, биологические, демографические, технические, экономические и другие аспекты, прямо или косвенно связанные с возникновением у населения злокачественных опухолей. По данным международных канцер-регистров, ежегодно в мире регистрируется 6,4 млн новых случаев злокачественных новообразований (за исключением рака кожи): 3,3 млн у мужчин и 3,1 млн у женщин.

Цель исследования: изучение распространенности онкологических заболеваний с тендерного подхода в семейной поликлинике № 4 г. Бухары.

Материалы и методы. Работа проводилась среди населения на территории поликлиники № 4 г. Бухары. Общая численность населения на 01.01.2013 г. составляет 30 643 человека, из них 16 037 женщин, что составляет 52,3 %. Ретроспективным методом были изучены амбулаторные карты больных, диспансерные формы. Использовались данные отчетов (квартальных, полугодовых, годовых). Распространенность онкологических заболеваний на территории поликлиники № 4 встречается в основном в группе взрослого населения. Общее количество онкологических больных составляет 117 человек, что составляет 38,5 на 10 000 человек.

Результаты и обсуждение. Наиболее распространенными онкологическими заболеваниями среди населения являются: рак молочной железы, лимфомы, опухоли кожи, рак легочной системы. Опухолями ротовой полости и раком желудка страдает в основном мужской пол. Основные причины, повышающие риск возникновения рака желудка: наследственный фактор, воздействие канцерогенов (консерванты, нитрозамины, чрезмерно грубая, копченая, жирная, пережаренная или острая пища), злоупотребление алкоголем. Среди онкологических заболеваний легочной системы и кишечника также частота распространенности выше среди мужчин. В развитии рака легкого немалую роль играет и курение, так как, согласно статистике, рак легкого у курящих наблюдается значительно чаще, чем у некурящих. Так, при выкуривании двух и больше пачек сигарет в сутки частота рака легкого возрастает в 15- 25 раз. Также развитию способствует работа на асбестовом, цементном производстве, облучение. Среди больных с раком соединительной ткани и опухолями кожи наибольший процент занимают мужчины в возрасте от 50 до 65 лет. Развитию рака печени способствует хронический вирусный гепатит (гепатит В, гепатит С). Среди онкологических заболеваний щитовидной железы, а также лимфомы преобладают мужчины. Рак молочной железы распространен среди женщин.

Выводы. Наиболее распространенными онкологическими заболеваниями среди населения поликлиники № 4 являются: рак молочной железы, лимфомы, опухоли кожи, рак легочной системы. Наибольший процент следующих онкологических заболеваний занимают мужчины: опухоли ротовой полости, рак пищевода, рак желудка и кишечника, рак органов дыхания и опорно-двигательного аппарата, опухоли кожи и мочевыделительной системы, лимфомы, рак щитовидной железы. Такая тендерная чувствительность в сторону мужского пола указывает на то, что вредные привычки (курение, употребление алкоголя), профессиональные вредности, характер пищи и др. являются одними из основных факторов риска, приводящих к развитию онкологических заболеваний.