

Колобухое А. Э., Шепетько М. Н., Барьяш В. В.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОК С РАКОМ ПЕДЖЕТА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск

Рак Педжета является достаточно редкой клинико-анатомической формой рака молочной железы.

Проведен анализ результатов лечения 32 пациенток с морфологически верифицированным раком Педжета, диагноз которым установлен в Минском городском клиническом онкологическом диспансере в 2003-2007 гг.

На момент установления диагноза возраст большинства пациенток (26) был старше 60 лет, от 40 до 60 лет — у 5 пациенток, у одной больной диагноз установлен в 32 года.

Все больные получили радикальное хирургическое лечение (27 — в МГКОД, 5 — в РНПЦО и МР). У 2 пациенток стадию опухолевого процесса установить не удалось, в 30 случаях после радикального хирургического лечения уставлены 1-2 стадии рака Педжета, наличие метастазов в подмышечных лимфоузлах установлено лишь у одной пациентки. Радикальная операция 29 пациенткам выполнена в объеме простой мастэктомии типа Madden, троим — широкая центральная секторальная резекция с лимфаденэктомией. 9 пациенток получили предоперационный курс лучевой терапии в СД 20 Гр, двое — послеоперационный. Большинство пациенток старше 60 лет после операции получали гормонотерапию антиэстрогенами. Адьювантную химиотерапию (6 курсов по схеме CMF) получила 1 пациентка.

Прогрессирование опухолевого процесса (метастазирование в лимфоузлы) через 10 лет после лечения в объеме радикальной секторальной резекции возникло лишь у 1 больной.

По результатам лечения за 5-летний период умерли 4 пациентки: одна — в раннем послеоперационном периоде, вторая — от прогрессирова-

ния распространенного рака второй молочной железы, оставшиеся — от неонкологических заболеваний. Таким образом, 5-летняя выживаемость для наблюдаемых пациенток составила 87,5 %.