

Жогал Е. П.

ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ РАКА ГОРТАНИ

Научный руководитель Буцель А. Ч.

Актуальность и научная новизна. Большинство пациентов с раком гортани поступают в лечебные учреждения в далеко зашедшей стадии заболевания. В связи с этим появилась необходимость интенсивно изучать роль различных факторов в развитии злокачественных новообразований с целью определения группы риска среди пациентов с последующим динамическим наблюдением за ними.

Цель работы: определить группу риска пациентов по развитию рака гортани для раннего выявления данной патологии.

Объект и методы исследования. Во время исследования в МГКОД был собран анамнез у 110 пациентов в возрасте от 47 до 82 лет с установленным диагнозом – рак гортани. Медиана возраста составила 62 года.

Полученные результаты и выводы:

1. Рак гортани был выявлен у 107 мужчин и 3 женщин, что говорит о том, что рак гортани встречается у мужчин в 35 раз чаще.

2. Наиболее часто встречаемой вредной привычкой среди пациентов с раком гортани было курение. 89% опрошенных пациентов являются курильщиками со стажем курения 20 и более лет.

3. Вредные производственные факторы, способствующие развитию рака гортани были обнаружены у 83 пациентов (75,45%).

4. Среди заболеваний, сопутствующих раку гортани были: хронический ларингит у 44 человек (40%), хронический гастрит - 9 человек (8,18%), папилломатоз гортани – 6 человек (5,45%), хронический бронхит 4 человека (3,64%). У 5 пациентов родственники болели раком гортани и раком легких.

5. Наиболее распространенными формами рака гортани среди всех опрошенных пациентов были: рак среднего отдела гортани (14 пациентов T₁N₀M₀ и 6 - T₂N₀M₀), рак вестибулярного и среднего отделов (10 человек T₂N₀M₀).

Уровень внедрения: кафедра болезней уха, гола, носа БГМУ.