

*Афранович Т. И., Кульбицкая Е. И.*  
**СОЦИАЛЬНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ  
БОЛЬНОГО ЧЕСОТКОЙ**

*Научный руководитель Навроцкий А. Л.*

**Актуальность и научная новизна.** Чесотка является одним из наиболее известных и распространенных в мире инфекционных дерматозов, вызываемых внешними паразитами человека. Она имеет повсеместное распространение, может возникать в виде эпидемических вспышек. Рост заболеваемости чесоткой тесно связан с социальными и экономическими проблемами общества, а также с большими потоками миграции населения. Скученность, плохие санитарные условия, несоблюдение правил личной гигиены, беспорядочные половые контакты способствует распространению заболеваемости чесоткой. Актуальность работы обусловлена постоянными изменениями в жизни общества, что приводит к появлению новых тенденций в социально-эпидемиологических и клинических характеристиках чесотки и требует постоянного анализа и разработки адекватных мер профилактики данной патологии.

**Цель работы:** изучение динамики заболеваемости чесоткой в Республике Беларусь за 1975 – 2012 годы и ее социально-эпидемиологических и клинических особенностей в городе Минске.

**Объект и методы исследования.** Ретроспективный анализ 601 амбулаторной и 501 стационарной карты больных чесоткой по данным Минского городского клинического кожно-венерологического диспансера за 2010-2011 годы, а также данные годовых отчетов о заболеваемости чесоткой в регионах Республики Беларусь за 1975-2012 годы.

**Полученные результаты и выводы:**

1. Заболеваемость чесоткой в Республике Беларусь в период с 1976 по 2012 гг. носила волнообразный характер, с интервалами между пиками подъема в 12 лет.

2. Пик заболеваемости приходится на 1981 год (197 случаев на 100 тысяч населения) и в 1994 год (263 случая на 100 тысяч населения).

3. На протяжении 18 лет наблюдается тенденция к снижению заболеваемости с подъемами в весенне-осенний период.

4. В 2010-2011 годах чесотка получила наибольшее распространение среди студентов (27,9%) и школьников (13,7%).

5. В основном болели молодые люди в возрасте от 17 до 23 лет (всего 515 человек, из них 64% юноши).

6. Чаще всего сыпь проявлялась на коже кистей (71,4%) и живота (86,4%).

7. Наиболее частыми осложнениями чесотки были контактный дерматит (10,8%) и пиодермия (12,8%).

**Уровень внедрения:** кафедра кожных и венерических болезней БГМУ.