

Взаимосвязь частоты выявления факторов риска развития кровотечения при подготовке к хирургическим вмешательствам в челюстно-лицевой области и числа осложнений у пациенток

Судакова Софья Евгеньевна

Белорусский государственный медицинский университет, Минск

Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, профессор Походенько-Чудакова Ирина Олеговна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск

Введение

Тщательный сбор анамнеза играет важную роль в деятельности врача любой специальности, в том числе стоматолога-хирурга и челюстно-лицевого хирурга. Зная имеющиеся у пациента факторы риска, врач-специалист может корректировать проводимое лечение для минимизации числа осложнений, развивающихся во время и после операции (Т.В. Вавилова, 2010; Ю. Г. Дегтярев, 2015). В связи с этим была выдвинуто предположение, что частота развития осложнений у пациента находится в прямой зависимости от того, насколько тщательно врач проводит сбор анамнеза.

Цель исследования

определить частоту выявления факторов риска развития осложнений во время и после операции при подготовке к хирургическим вмешательствам в челюстно-лицевой области и установить наличие ее взаимосвязи с числом осложнений у пациенток.

Материалы и методы

В ходе работы было проанализировано 400 стоматологических амбулаторных карт женщин, обращавшихся за оказанием специализированной помощи на амбулаторный прием к стоматологу-хирургу в стоматологической поликлинике, пациенток стоматологического отделения общей поликлиники и хирургических пациенток отделения оториноларингологии общей поликлиники.

Результаты

Анализ амбулаторных карт показал, что от общего числа пациенток стоматологической поликлиники процент лиц с выявленными заболеваниями, негативно влияющими на систему гемостаза, равнялся 20,7%. В то время как по данным стоматологического отделения общей поликлиники, процент пациенток, имеющих заболевания, влияющие на систему гемостаза, составляет 32%. Данные анализа амбулаторных карт пациенток отделения оториноларингологии, не имели существенных отличий от приведенных выше результатов для женщин, обратившихся за оказанием специализированной медицинской помощи в стоматологическое отделение общей поликлиники. Доля лиц у которых развились осложнения составила 6% по данным стоматологической поликлиники и 2% по результатам анализа документации пациенток общей поликлиники. Следует подчеркнуть, что анализ развернутой коагулограммы назначался только в единичных ситуациях, даже тогда, когда к этому имелись показания. Также было выявлено, что процент пациенток с развившимися осложнениями, лечившихся в общей поликлинике был меньше, чем у пациенток стоматологической поликлиники.

Выводы

Результаты проведенного исследования доказывают наличие прямой зависимости между тщательностью сбора анамнеза врачами хирургических специальностей и частотой развития осложнений у пациенток, как во время оперативных вмешательств, так и после их завершения.