

Патологическая наружная резорбция корня зуба

Пстыга Екатерина Юрьевна, Ероценко Александр Геннадьевич

Белорусский государственный медицинский университет, Минск

Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Даревский

Вячеслав Иосифович, Белорусский государственный медицинский университет, Минск

Введение

На сегодняшний день внутриканальное отбеливание зубов набирает всё большую популярность. Это может вызвать патологическую резорбцию корня зуба. Поэтому, опираясь на данные современной литературы и собственного исследования, мы решили подтвердить влияние внутриканального отбеливания на процесс резорбции корня зуба.

Цель исследования

Изучить влияние внутриканального отбеливания на процесс патологической резорбции корня.

Материалы и методы

На базе РКСП был проведен анализ внутридентальных рентгенологических снимков и стоматологической амбулаторной карты пациента И., 21 год. Диагноз: патологическая наружная резорбция корня зуба. Была использована научная литература по данной теме.

Результаты

При анализе рентгенологических снимков до внутриканального отбеливания у пациента не наблюдалось патологических изменений. Через год после отбеливания – патологическая наружная латеральная и цервикальная резорбция корня.

Выводы

На основании анализа литературы и собственных наблюдений было выявлено, что основной причиной патологической резорбции корня явилась ранее полученная травма зуба. Внутриканальное отбеливание, проведенное после эндодонтического лечения, значительно ускорило процесс резорбции.