

Анализ структуры суицидов в Беларуси в первой четверти 20 века

Кавенчук Александра Ярославовна

Белорусский государственный медицинский университет, Минск

Научный(-е) руководитель(-и) Доморацкая Татьяна Леонидовна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск

Введение

Каждого ученого, изучающего рождаемость, смертность, преступность и другие важные социальные явления, прежде всего интересует изменение данных явлений во времени и их развитие. По данным ВОЗ ежегодно более 800 000 человек лишают себя жизни, а значительно большее число людей совершают попытки самоубийства, при этом суициды являются второй ведущей причиной смерти среди лиц 15-29 лет. В РБ за 2016 год от самоубийств погибли 2042 человека, что составило 21,5 на 100 000 населения).

Цель исследования

Провести анализ структуры суицидов в Беларуси в первой четверти 20 века.

Материалы и методы

Материалами для данной работы послужили «статистические листки» о завершённых суицидах, которые были разработаны Центральным статистическим управлением согласно установленных форм; сведения медицинской секции Института Белорусской культуры (отдел природы) за 1927 год.

Результаты

В результате исследования были выявлены резкие колебания уровня суицидов в период с 1906 по 1925 год (при этом максимум пришёлся на 1924-1925 гг. – 25,9 на 100 000 населения, а минимум на 1912-1913 гг. – 11,5), с общей тенденцией к увеличению, при этом в городах суициды случались гораздо чаще, чем в сельской местности (максимум в 1908-1909 гг. – в 7,65 раз). За период 1924-1925 гг. наибольший уровень суицидов наблюдался в Минском и Витебском округах: 11,5 и 9,9 на 100 000 населения соответственно (165% к среднему уровню по БССР). Женские суициды в Минске в среднем составили 69% от мужских и их уровень имел тенденцию к увеличению. По данным за 1924-1925 гг. наибольший процент суицидов приходился на возраст 20-29 лет (41,7%) как у мужчин (42,5%), так и у женщин (39,9%). По месяцам наибольшее число суицидов совершилось в мае (13,8%) и июне (10,8%), наименьшее в апреле (6,1%) и ноябре (5,7%). Самыми распространённым способом суицида было повешение (41,75%). При этом у мужчин на втором месте были огнестрельные ранения (37,7%), а затем утопление (7,3%) и отравление (2,7%); а у женщин преобладали утопление (23,4%), отравление (20,3%), и затем огнестрельное оружие (12,0%).

Выводы

Уровень суицидов в Беларуси возрастал в первой четверти 20 века (1924-1925 гг. – 157% к первоначальному). Минский и Витебский округа занимали по числу суицидов первое место в БССР (на 65% больше среднереспубликанского). Завершённые суициды преобладали среди мужчин (59,2%). Наибольшая частота приходилась на возраст 20-29 лет (41,7%). Наиболее распространёнными способами суицидов являлись повешение (41,75%).