

## **Тактика лечения пациентов с облитерирующим атеросклерозом сосудов нижних конечностей, достигшим стадии гангрены.**

*Буйновский Юрий Александрович, Новик Максим Геннадьевич*

*Белорусский государственный медицинский университет, Минск*

*Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Безводицкая Антонина Алексеевна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск*

### **Введение**

Облитерирующий атеросклероз сосудов нижних конечностей (ОАСНК) - хроническое заболевание, сопровождающееся окклюзионно-стенотическим поражением артерий нижних конечностей вследствие отложения в их стенке липидов и проявляющееся недостаточностью артериального кровообращения в конечностях вплоть до развития критической ишемии.

### **Цель исследования**

Изучение результатов и методов лечения пациентов с ОАСНК в стадии гангрены.

### **Материалы и методы**

В ходе работы был проведён ретроспективный анализ 421 медицинской карты пациентов с ОАСНК, находившихся на стационарном лечении во 2-ом хирургическом отделении 5 ГКБ в 2016 году. У 44 из данных пациентов ОАСНК привёл к развитию гангрены нижней(-их) конечности(-ей).

### **Результаты**

В ходе исследования было установлено, что в структуре пациентов с ОАСНК в 2016 году 28% составляют женщины, средний возраст которых составляет 73,5 года. Большинство пациентов (72%) составляют мужчины со средним возрастом 68,5 лет. Среди пациентов с ОАСНК, достигшим стадии гангрены 80% составляют мужчины со средним возрастом 67 лет, 20 % женщины – 81 год. Каждому из 44 пациентов с развившейся гангреной было предложено оперативное вмешательство по поводу ампутации, которое было проведено 60 % пациентов.

### **Выводы**

Наиболее рациональным видом помощи пациентам с гангреной является ампутация нижней конечности. Проведение операций во многих случаях опасно возможными осложнениями в связи с пожилым возрастом пациентов, а также наличием широкого спектра сопутствующей патологии.