

Абдуллаев М. Д., Чигиренко А. С.

АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЕПАРАТОВ "КАЛЬСЕПТ" И "МЕТАРЕХ" ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ГРАНУЛИРУЮЩЕМ ПЕРИОДОНТИТЕ

*Научные руководители канд. мед. наук Кочкина Н. Н.,
канд. мед. наук, доц. Сердюк С. В.*

*Кафедра терапевтической стоматологии, кафедра фармакологии
Оренбургский государственный медицинский университет*

Актуальность. В настоящее время представлен широкий спектр материалов для временного пломбирования корневых каналов, поэтому вопрос о препаратах, обладающих наиболее эффективным действием в отношении периапикального очага воспаления, является весьма актуальным.

Цель: провести клиническую оценку препаратов для временного пломбирования корневых каналов "Кальсепт" и "Метарех" при хроническом гранулирующем периодонтите.

Материалы и методы. На кафедре терапевтической стоматологии Оренбургского государственного медицинского университета проведена клиническая оценка эффективности препаратов для временного пломбирования корневых каналов. В течении 6 месяцев проводилось лечение 4 пациентов с диагнозом хронический гранулирующий периодонтит, в возрасте 30-50 лет. Все пациенты были разделены на две группы, в каждой из которых было по 2 человека. В первой группе препаратом для временного пломбирования корневых каналов являлся «Кальсепт», во второй группе - «Метарех». Статическую обработку результатов проводили параметрическим (метод Стьюдента) и непараметрическим (критерий Вилкоксона-Манна-Уитни) методами.

Результаты и их обсуждение. На повторных приемах был проведен рентгенологический контроль и оценка общего состояния пациентов. Жалобы в двух группах пациентов: состояние значительно улучшилось, на прицельной рентгенограмме очаг деструкции незначительно уменьшился. Жалобы на боли, болезненность при надкусывании у первой группы пациентов, которым пломбировали каналы «Кальсептом» отсутствовали. Во второй группе, где каналы пломбировали «Метарех» незначительные боли сохранялись на протяжении десяти дней у одного пациента. Аллергических реакций, неприятного запаха изо рта не наблюдалось ни у одного из обследуемых пациентов. Общее состояние, слизистая оболочка полости рта были в норме у двух групп пациентов. Пальпация так же у всех была безболезненна. Однако пациент, которому каналы пломбировали «Метарех» жаловался на незначительные боли при перкуссии, все остальные пациенты при перкуссии жалоб не предъявляли. На рентгенограмме очаг деструкции у двух групп пациентов значительно уменьшился. Однако, в группе, где использовали «Кальсепт» очаг деструкции уменьшился больше, нежели в группе, где использовали «Метарех».

Выводы. Таким образом, несмотря на заявленные фирмой положительные стороны препарата «Метарех» на основе представленных клинических случаев, можно сделать вывод, что при лечении хронического гранулирующего периодонтита «Кальсепт» обладает более эффективным действием в отношении периапикального очага воспаления.