

Современные клинико-эпидемиологические особенности клещевого энцефалита в Республике Беларусь

Клименкова Екатерина Ивановна, Курбанова Гульнара Байрамгельдыевна

Белорусский государственный медицинский университет, Минск

Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Соловей Никита Владимирович, Белорусский государственный медицинский университет, Минск

Введение

Клещевой энцефалит (КЭ) является самой распространенной трансмиссивной инфекцией в Республике Беларусь, поражающей нервную систему. Знание современных клинико-эпидемиологических особенностей заболевания позволяет ускорить его диагностику и своевременно выбрать адекватную тактику ведения пациентов.

Цель исследования

Определить современные особенности течения КЭ у пациентов, госпитализированных в УЗ «ГКИБ» г. Минска в 2016-2017 гг.

Материалы и методы

Проведен ретроспективный анализ 38 медицинских карт пациентов с различными клиническими формами КЭ, госпитализированных в УЗ «ГКИБ» г. Минска в 2016-2017 гг. Статистическая обработка данных осуществлялась с использованием программы SPSS 21.0.

Результаты

Медиана возраста пациентов составила 50,5 лет, 60,5% – мужчины. Наиболее распространенной клинической формой КЭ являлась менингеальная (65,8%), в меньшей степени встречалась менингоэнцефалитическая (18,4%) и лихорадочная (13,2%) формы. Присасывание клещей в границах инкубационного периода заболевания отмечали только 76,3% пациентов, в то время как посещение леса и/или парка отмечено у 92,1%, работа на приусадебных участках – у 63,2% пациентов. Считающееся характерным для КЭ двухволновое течение заболевания встречалось только у 47,4% пациентов. Противоклещевой иммуноглобулин вводился 73,7% пациентов. На момент выписки из стационара неврологических отклонений не выявлено у 94,7%, у 5,3% оставались резидуальные последствия.

Выводы

В настоящее время КЭ чаще регистрируется у лиц старшей возрастной группы, преобладающими клиническими формами являются менингеальная (65,8%) и менингоэнцефалитическая (18,4%). Важнейшими эпидемиологическими факторами, позволяющими предполагать наличие у пациента КЭ, являются посещение леса и лесопарков, присасывание клещей и работа на приусадебных участках. КЭ на современном этапе в Республике Беларусь характеризуется преимущественно среднетяжелым течением, 94,7% пациентов не имеют неврологических отклонений на момент выписки из стационара.