

Ванькович А. А., Ромащенко Е. И.
**СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭПИДЕМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО
ТУБЕРКУЛЕЗУ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСИ И СТРАНАХ БЛИЖНЕГО
ЗАРУБЕЖЬЯ**

Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Бородина Г. Л.
Кафедра фтизиопульмонологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск

Актуальность. Туберкулез продолжает оставаться распространенным заболеванием, наносящим значительный ущерб здоровью населения и экономике стран всего мира, и одной из самых актуальных проблем современной медицины, так как является одной из 10 ведущих причин смерти. В 2015 году туберкулезом заболели 10,4 миллиона человек, и 1,8 миллиона (в том числе 0,4 миллиона с ВИЧ) умерли от этой болезни. Ежегодно разрабатываются и совершенствуются программы и методики, направленные на снижение заболеваемости и смертности.

Цель: анализ динамики показателей заболеваемости, смертности и распространенности туберкулеза в Республике Беларусь по сравнению с соседними странами европейского региона ВОЗ.

Материалы и методы. Анализ данных официальной статистики по общей заболеваемости и смертности от туберкулеза в Республике Беларусь за период с 2006 по 2015 г и официальных данных по странам европейского региона ВОЗ.

Результаты и их обсуждение.

Исследование позволило установить:

1. Самые высокие показатели заболеваемости и смертности от туберкулеза среди стран европейского региона ВОЗ отмечаются в России и Украине, самые низкие – в странах Балтики и Польше. В структуре заболеваемости туберкулезом во всех странах доминирующее значение имеет туберкулез легких. Наиболее высокие темпы снижения заболеваемости туберкулезом отмечаются в странах Балтики (Литва).

2. Благодаря осуществлению государственных программ по борьбе с туберкулезом в РБ удалось достигнуть значительной позитивной динамики основных эпидемиологических показателей: в 2015 году заболеваемость составила снизилась на 39% по сравнению с 2006 годом и на 4,6% по сравнению с 2014 годом. Смертность снизилась до уровня 4,1 на 100 000 населения, в то время как в 2006 году она составляла 12,1 на 100 000 населения.

3. Современная эпидемиологическая ситуация во всех странах европейского региона ВОЗ кроме Эстонии характеризуется значительным распространением туберкулеза с множественной (МЛУ-ТБ) и широкой лекарственной устойчивостью (ШЛУ – ТБ).

4. В РБ доля МЛУ-ТБ среди всех бактериовыделителей составляет в настоящее время около 80%, что является одним из самых высоких показателей в регионе и мире.

5. За исключением множественной лекарственной устойчивостью возбудителя туберкулеза ВИЧ-ассоциированный туберкулез является основной причиной, сдерживающей снижение заболеваемости и смертности от туберкулеза во всем анализируемом регионе.

Выводы.

1) Во всех странах Европейского региона ВОЗ наблюдается устойчивая тенденция к снижению заболеваемости и смертности от туберкулеза, однако темпы снижения значительно различаются в разных странах.

2) Увеличивается число случаев и доля туберкулеза с множественной и широкой лекарственной устойчивостью возбудителя.

3) Возрастает заболеваемость ВИЧ-ассоциированным туберкулезом.