

Пулатов М.Д., Ахмадалиев С.М., Ёлмасов М.В.

ОЦЕНКА ПРЕПАРАТА «ПРОКТАЗАН» У БОЛЬНЫХ С ГЕМОРРОЕМ И ЗАБОЛЕВАНИЯМИ АНОРЕКТАЛЬНОЙ ЗОНЫ

Андижанский государственный медицинский институт

***Резюме:** Малоподвижный образ жизни, несбалансированное питание, запоры, тяжёлый физический труд часто приводит к развитию такого тяжёлого заболевания, как геморрой, характеризующегося увеличением кавернозных телец прямой кишки с застоем в них крови. Благодаря внедрению в широкую клиническую практику новейших консервативных и малоинвазивных способов лечения выполнение радикальной геморроидэктомии показано не*

более чем у 30% всех больных геморроем. Проктазан - высокоэффективный препарат для лечения геморроя и других анаэробных заболеваний прямой кишки и ануса. Признаками эффективности этого препарата являются клиническая регрессия, отсутствие побочных эффектов, хорошая переносимость, высокая степень адсорбции.

Ключевые слова: геморрой, проктозан, анальное отверстие, трещина, заживление.

Актуальность темы: Чаще всего заболевание проявляется жжением, зудом, болью, ощущением дискомфорта и кровотечением. По статистическим данным геморрой диагностируется более чем у 10% взрослого населения, а удельный вес от общего числа колопроктологических заболеваний составляет 40% [1-4]. Геморрой протекает в двух формах: хронический и острый. Диагноз ставится на основании пальцевого обследования и эндоскопического исследования. Основными целями фармакотерапии острого и хронического геморроя, а также сопутствующих заболеваний анального канала и нижнеампулярного отдела прямой кишки являются: Купирование симптомов острого геморроя; Предотвращение осложнений; Профилактика обострений при хроническом течении заболевания; Предоперационная подготовка; Послеоперационная реабилитация. Для достижения вышеуказанных целей в настоящее время применяется комплексная терапия, включающая как препараты системного действия, направленные прежде всего на лечение сосудистых нарушений в геморроидальных узлах, так и медикаментозные средства местного действия, направленные на ликвидацию воспалительного процесса, и, следовательно, болевого синдрома, а также геморроидальных кровотечений.

Для лечения этого заболевания у больных мы использовали препарат «Проктазан» фармацевтической компании Stada (Германия) в форме мази и суппозиторий. Мазевой основой препарата является натуральное масло какао, обладающее обволакивающим и смягчающим действием. Также следует отметить, что в состав всех препаратов ряда «Проктазан» входит 3% масло печени акулы, которое содержит витамины А, Д, Е, алкилглицерил, сквален, свободные жирные кислоты и минералы, способствующие лечебному воздействию на слизистую оболочку прямой кишки, стимулируя репаративные процессы. Масло печени акулы обладает уникальными антиоксидантными свойствами.

Цель исследования: изучение клинического эффекта и безопасности применения препаратов «Проктазан» у амбулаторных больных с геморроем и заболеваниями аноректальной зоны.

Материал и методы исследования: в исследование было включено 48 пациентов, находившихся на амбулаторном лечении с хроническим и острым геморроем и сопутствующими заболеваниями аноректальной области за 9 месяцев в городской клинике №1 г. Андижана. Из них: хронический геморрой II – III стадии - 27 человек, геморроидальный тромбоз – 15 человек, анальные трещины – 6 человек. Мужчин было – 31, женщин – 17. Давность с начало обострения до момента обращения была от 1 до 7 суток и в среднем составила 3,4 дня. Обследование пациентов до лечения и в динамике включало:

- осмотр перианальной области (наличие увеличенных узлов с явлениями отека);

- пальцевое исследование прямой кишки (наличие тромбированных внутренних узлов, повышение тонуса анального сфинктера);
- anoscopy (наличие эрозированных внутренних геморроидальных узлов);
- ректороманоскопию.

Эффект адекватного обезболивания возникал у пациентов в среднем через 3-10 минут, что было связано с эффективным всасыванием этого агента. В течение 2-3 минуты свеча практически полностью расплавлялась. Крайне важно, что в процессе использования свечей не было отмечено отрицательных побочных явлений, что характеризует этот медикаментозный препарат как безопасный и легко переносимый. У 18 пациентов с выраженным тромбозом наружных и внутренних геморроидальных узлов проводилась комбинированная терапия. В комплексе с местной терапией назначался флебопротекторный препарат –Флебодия-600, что позволило добиться значительного снижения болевого синдрома.

Результаты и их обсуждение: Эффект устранения зуда и дискомфорта возникал у пациентов в течение первых 5 минут с момента введения в прямую кишку. У 87,5% пациентов при применении препарата «Проктазан» мы достигли положительного результата лечения: исчезли отёк тканей, зуд промежности, чувство дискомфорта, кровоточивость. В единичных случаях после введения свечей Проктазан отмечались гиперемия и усиления зуда в области анального отверстия, которые проходили через 5-10 минут, без проведения каких-либо дополнительных мероприятий. Необходимо отметить, что применение свечей и мази «Проктазан» не вызвало аллергических реакций, что характеризует этот препарат как безопасный и легко переносимый пациентами.

Таким образом было выявлено: Препарат «Проктазан» является эффективным средством лечения геморроя и других заболеваний аноректальной зоны. Обладает выраженным противовоспалительным, ранозаживляющим, обезболивающим и кровоостанавливающим эффектом. Исследуемый препарат практически не имеет побочных эффектов и хорошо переносится пациентами, экономически выгоден и имеет хорошие перспективы при применении в колопроктологической практике.

Литература

1. Борисов М.Ф. Патогенез и классификация хронического геморроя. В сб.: «Актуальные вопросы проктологии» Тезисы докладов Всес. конф. г. Киев. М.,1989, с.222-224.
2. Воробьев Г.И., Шелыгин Ю.А., Благодарный Л.А. Геморрой, М, Митра-Пресс, 2002. Место для формулы.
3. Ривкин В.Л., Дульцев Ю.В., Капуллер Л.Л. Геморрой и другие заболевания заднепроходного канала. – М.: Медицина, 1994. – 240с.
4. Федоров В.Д., Дульцев Ю.В., Рывкин В.Л. и др. Проктология. – М.: Медицина, 1984. – 380с