

*Мильто Е. В.*  
**ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ДЕФОРМАЦИЙ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ**  
*Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Хомич С. Ф.*  
*Кафедра челюстно-лицевой хирургии*  
*Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск*

**Актуальность.** Деформации нижней челюсти являются распространенной патологией челюстно-лицевой области, что связано с ростом как травматических, так и опухолевых поражений. Тяжелые врожденные и приобретенные пороки развития являются не только медицинской, но и социальной проблемой, для решения которой необходим комплекс мероприятий, направленных на лечение и реабилитацию таких больных. Основным критерием наличия деформации челюсти является нарушение жевательной функции и речи. О деформации одной или обеих челюстей речь может идти лишь при резком отклонении от условных средних величин, наиболее соответствующих остальным отделам лица данного индивидуума.

Нижняя прогнатия (нижняя макрогнатия, прогения) - это одна из наиболее тяжелых деформаций лица, характеризующаяся увеличением нижней челюсти с выступанием подбородка и нарушением прикуса. Прикус имеет обратное соотношение фронтальных зубов, между которыми отсутствует окклюзионный контакт.

**Цель:** оценить эффективность применения двусторонней одномоментной косой скользящей остеотомии ветвей нижней челюсти при лечении нижней прогнатии.

**Материалы и методы.** Проводились хирургические вмешательства пациентам с установленным диагнозом нижней прогнатии. В качестве хирургического лечения пациентам выполнялась двусторонняя одномоментная косая скользящая остеотомия ветвей нижней челюсти. Метод отличается простотой выполнения, а также хорошими функциональными и эстетическими результатами.

**Результаты и их обсуждение.** Все пациенты с фиксированной челюстью наблюдались до 30-40 дней, затем выполняли лечебную физкультуру. После операции у пациентов менялся внешний вид лица, стало возможным откусывание и пережевывание пищи, зубы устанавливались в нормальное окклюзионное положение.

**Выводы.** Учитывая хороший эстетический результат, создание оптимальных функциональных возможностей, относительную простоту и безопасность выполнения операций, можно считать, что данный способ является наиболее подходящим для лечения нижней прогнатии. Не исключаются и другие многочисленные методики оперативных вмешательств, а так же варианты ортодонтического лечения, но при таких аномалиях развития и деформациях, как правило, специалисты обращаются к возможностям ортогнатической хирургии.