

Анализ частоты выполнения тонзилэктомии у детей с хроническим тонзилитом

Бобрышев Артем Иванович, Зверко Ольга Ивановна

Гродненский государственный медицинский университет, Гродно

Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Головач

Екатерина Николаевна, Гродненский государственный медицинский университет, Гродно

Введение

Хронический тонзиллит (ХТ) представляет собой длительно протекающий инфекционно-аллергический воспалительный процесс в небных миндалинах, который формируется в результате постоянного взаимодействия патогенной микрофлоры с макроорганизмом. На долю ХТ приходится от 4 до 15,8% всех заболеваний у детей. При отсутствии эффекта от консервативного лечения, а также в тех случаях, когда имеется уже декомпенсированный тонзиллит, проводится хирургическое лечение.

Цель исследования

Провести анализ частоты выполнения тонзиллэктомии у детей с хроническим тонзиллитом.

Материалы и методы

Проведен анализ данных журнала оперативных вмешательств в гнойном отоларингологическом отделении для детей на базе УЗ «ГОКБ» за 2016 г. Общее количество поступивших в стационар за 2016 год с ХТ составило 105 человек, из них операция тонзиллэктомии была выполнена у 72 (69%) детей (43 девочки и 29 мальчиков). Средний возраст - $11 \pm 4,7$ лет.

Результаты

Наиболее часто операция проводилась в возрастной категории от 12 до 17 лет – 39 пациентов (54%). В 97% операций применялась общая анестезия. Одновременно с тонзиллэктомией в 22% была выполнена аденомотомия. Во всех случаях наблюдался положительный исход операции. Послеоперационный период протекал без осложнений.

Выводы

1. Необходимость в хирургическом лечении хронического тонзиллита составила 69% от общего числа поступивших с ХТ, что является достаточно высокими показателями. 2. Достоверно чаще тонзиллэктомия выполнялась в возрасте 12-17 лет.