

ВЗАИМОСВЯЗЬ СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ И КАТАТОНИЧЕСКОЙ СИМПТОМАТИКИ У БОЛЬНЫХ ШИЗОФРЕНИЕЙ

Некрасов В.А., Боголюбова А.Ю.

Санкт-Петербургская государственная медицинская академия им. И.И. Мечникова

Зачастую врачами не уделяется достаточного внимания кататоническим симптомам, встречающимся в рамках различных психических расстройств, а не только в рамках кататонической формы шизофрении. Известна взаимосвязь кататонической симптоматики и аутоагрессивного поведения, что важно для ведения больного на амбулаторном этапе.

Цель исследования: изучить взаимосвязь кататонической симптоматики и склонности к аутоагрессивному поведению у больных шизофренией.

Материал исследования: 24 больных, переносивших обострение в рамках параноидной формы шизофрении, были обследованы в течение 1–7 дней после госпитализации в психиатрическую больницу св. Николая Чудотворца. Из них 10 имели в анамнезе суицидальные попытки (основная группа), 14 не имели (группа сравнения).

Методы исследования: клинико-психопатологический, клинико-анамнестический, метод психометрических шкал (Шкала кататонии Northoff at all. (1999) и BFCRS (1996)).

Результаты. Как при использовании шкалы кататонии Northoff at all, так и шкалы BFCRS был выявлен статистически значимо ($p < 0,05$) более высокий общий балл кататонической симптоматики в группе больных, совершавших суицидальные попытки, что соответствует данным литературы. При этом статистически значимые различия также отмечались по субшкале «Аффективные изменения» кататонии Northoff at all, по субшкалам «Моторные изменения» и «Поведенческие изменения» значимых различий не выявлялось. Кроме того, при оценке структуры кататонической симптоматики в обеих группах были выявлены следующие различия: В основной группе статистически значимо ($p < 0,05$) имелись более высокие значения по параметрам тревоги, персеверации, амбивалентности шкалы кататонии Northoff at all.

Выводы. Кататоническая симптоматика является значимым фактором риска аутоагрессивного и суицидального поведения. При этом роль кататонии в формировании аутоагрессии сложна и не объясняется действием одного какого-либо симптома (например, импульсивностью больных).