

## **ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ИНФЕКЦИЯМИ, ПЕРЕДАЮЩИМИСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ**

*Навоша О.А., Журавлевич Н.Е.*

*Белорусский государственный медицинский университет*

По данным Всемирной организации здравоохранения, в настоящее время в мире известно более 30 инфекций, передаваемых половым путем (ИППП), каждый шестой житель планеты страдает какой-либо из болезней, передаваемых половым путем. Вопросы изучения динамики заболеваемости, медико-социальных особенностей и совершенствования мер профилактики ИППП являются весьма актуальными.

ИППП преобладают среди молодежи, вступившей в наиболее активную фазу детородного возраста. Это ведет к прямому отрицательному влиянию этих заболеваний на демографическую ситуацию в республике.

К основным последствиям ИППП относятся нарушения репродуктивной функции, проблемы невынашивания плода при беременности, развитие мужского и женского бесплодия, увеличение риска развития онкологических заболеваний мочеполовых органов.

Общий показатель заболеваемости инфекциями, передающимися половым путем, по республике составляет 1454,6 случаев на 100 тыс. населения, что на 7,7 % меньше, чем в 2009 году.

Наибольший удельный вес среди всех ИППП занимают уреаплазмоз (около 20 %), трихомоноз (10 %), хламидиоз (8,5 %). По сравнению с 2009 годом по РБ снизилась заболеваемость сифилисом на 33 %, микоплазмозом — на 32 %, уреаплазмозом — на 24 %, хламидиозом — на 19 %, гонореей — на 17 %, генитальным герпесом — на 14,6 %, трихомониазом — на 11 %.

Уровень заболеваемости сифилисом и гонококковой инфекцией в Беларуси устойчиво снижается.

Эпидемиологическая ситуация с заболеваемостью сифилисом в Республике Беларусь за последние 10 лет сильно контрастирует с уровнем заболеваемости сифилисом в США и странах Западной Европы, где уже более 15 лет интенсивные показатели заболеваемости практически не превышали 6 случаев на 100 тысяч населения, и даже со странами Балтии, где заболеваемость в 2–4 раза ниже, чем в Республике Беларусь.