

*Литвинчук Я. О.*

**ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ МЯГКОЙ ЛЕЙКОПЛАКИИ СЛИЗИСТОЙ  
ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА СРЕДИ СТУДЕНТОВ 3-ГО КУРСА  
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА БГМУ**

*Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Казеко Л. А.*

*1-ая кафедра терапевтической стоматологии*

*Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск*

**Актуальность.** Мягкая лейкоплакия - хроническое дистрофическое заболевание, сопровождающееся процессами ороговения слизистых оболочек, в том числе и в полости рта (Пашков Б.М., 1963 г.). Этиология заболевания неизвестна, но рассматривается ряд причинных факторов, которые, вероятно, влияют на развитие мягкой лейкоплакии. К ним относят вредные привычки (курение, прикусывание слизистой, частое употребление горячих напитков), местные факторы риска (острые края зубов, некачественные пломбы, протезы), психоэмоциональные факторы, соматические заболевания, не исключена наследственная предрасположенность к развитию данного заболевания. По разным литературным источникам, распространенность мягкой лейкоплакии среди всех заболеваний СОПР колеблется от 0,5% до 6,8% случаев. Согласно классификации Полнаревой Б.Д. (1972), выделяют типичную и атипичную формы мягкой лейкоплакии. Типичная форма подразделяется на очаговую и диффузную формы. Как правило, жалобы у пациентов отсутствуют, и впервые изменения слизистой полости рта регистрируются случайно при осмотре. При тяжелом течении заболевания возможно появление жалоб на стянутость, шероховатость, жжение и боль при приеме пищи.

**Цель:** определить частоту встречаемости мягкой лейкоплакии слизистой полости рта среди студентов 3-го курса стоматологического факультета БГМУ.

**Материалы и методы.** Исследование проводилось на базе 1-ой кафедры терапевтической стоматологии, УО «Белорусский государственный медицинский университет», среди студентов третьего курса стоматологического факультета. Стоматологическое обследование проводилось согласно схеме, рекомендованной ВОЗ. Все обследуемые дали письменное информированное согласие на участие в исследовании.

**Результаты и их обсуждение.** Обследовано 100 человек. Определена частота встречаемости мягкой лейкоплакии среди обследуемых. Среди всех форм мягкой лейкоплакии слизистой оболочки полости рта преобладает диффузная форма.

**Выводы.** Проанализировав полученные данные, можно сделать вывод о высокой распространенности мягкой лейкоплакии среди студентов 3-го курса стоматологического факультета.