

Боровская О. С., Зекова Д. А.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ ВЫВИХА АКРОМИАЛЬНОГО КОНЦА КЛЮЧИЦЫ ПРИ ПОМОЩИ КРЮЧКОВИДНОЙ ПЛАСТИНЫ

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Беспальчук А. П.

Кафедра травматологии и ортопедии

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск

Актуальность. Вывихи акромиального конца ключицы являются серьезной проблемой из-за большого количества осложнений и высокой частоты инвалидизации пациентов.

Медицинское и социальное значение этих повреждений велико, поскольку разрывам акромиально-ключичного сочленения подвержены молодые, социально-активные лица, занимающиеся физическим трудом и спортом. После вывиха происходят необратимые дегенеративно-дистрофические изменения в акромиально-ключичном сочленении.

Цель: изучить результаты хирургического лечения вывиха акромиального конца ключицы при помощи крючковидной пластины.

Материалы и методы.

Материалами исследования явились медицинские карты стационарных пациентов, поступивших в УЗ «6-я городская клиническая больница» г. Минска, с вывихом акромиального конца ключицы в период с 2015 по 2018 гг.. Хирургическое лечение с использованием крючковидной пластины выполнено 31 пациенту. Результаты данного лечения оценивали на основании устного интервьюирования по заранее разработанным вопросам. В дальнейшем проводили статистическую обработку результатов интервьюирования пациентов.

Результаты и их обсуждение.

Интервьюирование проводилось с 29 пациентами (93,55%), с 2-мя пациентами связаться не удалось (6,45%). Среди опрошенных доля мужчин составила 93,11%, женщин – 6,89%. Возрастной диапазон составил от 18 до 70 лет.

В ходе исследования была замечена тенденция к сходству результатов опроса у пациентов определенного возраста. Пациенты были условно разделены на 2 группы, критерием отбора послужил возрастной показатель. В 1-ю группу были включены пациенты в возрасте от 18 до 40 лет, их составило 16 человек (55,17 %), во вторую – от 41 до 80 лет, в данную группу вошли 13 человек (44,83%).

В первой группе пациенты оценили эффект от хирургического лечения при помощи крючковидной пластины, как хороший в 9 случаях (56,25%), удовлетворительный – 5 случаев (31,25%), неудовлетворительный – 2 случая (12,5%). Во второй группе: хороший эффект – 4 случая (30,77%), удовлетворительный – 5 случаев (38,46%), неудовлетворительный - 4 случая (30,77%).

Положительный эффект был достигнут в 79,3% случаев.

Выводы:

1. Использование крючковидной пластины может быть использовано для лечения вывиха акромиального конца ключицы.
2. Хирургическое лечение с использованием крючковидной пластины выполнено 31 пациенту.
3. Пациенты первой группы (от 18 до 40 лет) довольны результатом хирургического лечения и находят этот метод эффективным.
4. Этот метод недостаточно эффективен у пациентов во второй группе (от 41 до 80 лет), что заставляет задуматься о поиске альтернативных методов лечения.