

Антипина Е. О.

КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БАЗАЛИОМЫ ПО ДАННЫМ БИОПСИЙ

Научный руководитель канд. мед. наук, ст. преп. Лагодская И. Я.

Кафедра патологической анатомии

Гродненский государственный медицинский университет, г. Гродно

Актуальность. В настоящее время во всем мире наблюдается неуклонный и значительный рост заболеваемости злокачественными новообразованиями кожи (ЗНК). Базалиома относится к числу наиболее распространённых опухолей человека, составляя до 75% всех эпителиальных немеланомных новообразований кожи.

Цель: дать клинико-морфологическую характеристику базально-клеточного рака на основании данных биопсий.

Материалы и методы. Материалом исследования стали данные гистологических заключений за 2017 год из архива УЗ «ГОКПАБ».

Результаты и их обсуждение. Проанализировано 436 гистологических заключений со случаями ЗНК. Проведена оценка частоты встречаемости гистологических форм базально-клеточного рака (БКР), локализации опухоли, а также пола и возраста пациентов, страдающих данным заболеванием.

БКР встречался в 300 случаях (69 % всех случаев ЗНК), из них солидная базалиома – в 233 наблюдениях (78 % всех случаев БКР); поверхностная базалиома – в 35 (12 %); базалиома без дополнительных уточнений – в 18 (5 %); базально-плоскоклеточный рак (метатипическая карцинома) – в 5 (2 %); пигментный БКР – в 3 (1 %); склеродермоподобная (морфеаподобная) базально-клеточная карцинома – в 3 (1 %); аденоидная базалиома – в 3 (1 %).

В 155 случаях (52 %) локализацией БКР была кожа лица, в 47 (16 %) – кожа волосистой части головы, в 46 (15 %) – туловище, в 25 (8 %) – околоушная область и ушная раковина, в 17 (6 %) – конечности, в 10 (3 %) – шея.

Среди пациентов с БКР преобладали лица женского пола – 176 человек (59 %), мужчины – 124 человека (41 %), пик заболеваемости наблюдался в возрасте 60-80 лет (61 %).

Выводы.

1. Наиболее часто встречающейся гистологической формой БКР была солидная базалиома (78 % всех случаев БКР).

2. Преимущественная локализация БКР – кожа лица (52 % случаев).

3. Среди пациентов с БКР преобладали женщины – 59 %.

4. Пик встречаемости базалиомы пришелся на возраст 60-80 лет (61 % пациентов).