

Лихограй Л. И., Уколова Е. С.

ОСЛОЖНЕНИЯ И ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У МНОГОРОЖАВШИХ ЖЕНЩИН

Научные руководители ассист. Воронцова Н. А.

ассист. канд. мед. наук Сенникова Ж. В.

Кафедра акушерства и гинекологии

Оренбургский государственный медицинский университет, г. Оренбург

Актуальность. Особенности течения беременности и родов у многоплодных женщин объясняют дистрофическими процессами, которые особенно выражены в матке, преждевременным старением всех органов и систем. Синдром истощения материнского организма развивается после частых родов (интервал между родами менее 2 лет). Комплекс этих особенностей способствует развитию тех же осложнений течения беременности и родов, что и у старых первородящих.

Цель: оценить особенности течения беременности и родов у многоплодных женщин.

Материал и методы. Был проведен анализ историй родов в областном перинатальном центре Оренбургской областной клинической больницы № 2 за 18 месяцев 2016–2018 гг.

Результаты и их обсуждение. За этот период в областном перинатальном центре было проведено 8861 роды, из них многоплодных женщин с 5 и более родами было 176 (2%). Распределение по возрасту: 20–30 лет – 38 (21,7%), 30–40 лет – 128 (72,7%), 40 и старше – 10 (5,7%). Паритет родов: пятые роды – 106 (60,2%), шестые – 46 (26,1%), седьмые – 18 (10,2%), восьмые – 3 (1,7%), девятые роды и более – 3 (1,7%). Течение беременности у них характеризовалось высоким процентом осложнений. Частота экстрагенитальной патологии составила: болезни мочеполовой системы – 43 (35,8%), анемия – 59 (33,5%), болезни системы кровообращения – 24 (20%), болезни крови – 9 (7,5%), резус-конфликт – 13 (10,8%), редкие заболевания – 18 (15%). Срочные роды наблюдались у 148 (84%), преждевременные – у 28 (16%) женщин. В 7 (3,9%) случаях были роды двойней. Основным показанием к плановой операции кесарева сечения у 17 (9,6%) женщин был рубец на матке после предшествующей операции кесарево сечение в сочетании с незрелыми родовыми путями. Экстренная операция кесарева сечения у 39 (22,15%) женщин была проведена: у 22 (56,4%) пациенток по поводу рубца на матке после операции кесарево сечение, у 17 (43,6%) – экстрагенитальной патологии, требующей исключения потуг. Всего родилось 183 ребенка, причем 14 из них дети из двойни. Дети имели массу при рождении до 3000 г – 56 (30,6%); от 3001 до 3500 г – 54 (30,6%); от 3501 до 4000 г – 49 (26,8%), от 4000 г и больше – 24 (13,1%). Оценка по шкале Апгар преобладала 8–9 баллов – 125 (68,3%), 6–7 баллов – 38 (20,77%), 4–5 баллов – 13 (7,1%), 1–3 балла – 3 (1,64%). Всего самостоятельных родов – 120 (68,2%). Осложнения в родах: в 1 (0,8%) случае наблюдался разрыв влагалища, в 1 (0,8%) – разрыв шейки матки, в 3 (2,5%) – разрыв промежности 1-й ст., в 10 (8,3%) – кровотечение в послеродовом и послеродовом периоде.

Выводы. Анализ данных позволяет заключить, что проблема многоплодных женщин актуальна. Прегравидарная подготовка и планирование беременности позволит снизить частоту осложнений гестации и улучшить перинатальные исходы у многоплодных женщин.