

Мажуга Ю. И., Гарлыев Ч.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ПЕРВИЧНОЙ ПЕРИТОНЕАЛЬНОЙ
КАРЦИНОМОЙ**

Научный руководитель ассистент Тур Г. Е.

Кафедра онкологии

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск

Актуальность. Первичная перитонеальная карцинома (ППК) по данным различных авторов составляет около 7-15%. Критерием установления диагноза является поражение брюшины, сальника с минимальным вовлечением поверхности яичников при их нормальных физиологических размерах.

Цель: определить результаты лечения пациентов с ППК.

Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ историй болезни 72 больных, которым в период 2008-2017 г.г. было проведено лечение по поводу морфологически верифицированной и соответствующей критериям установления диагноза ППК. Средний возраст составил $62,5 \pm 11,5$ (31 – 82) лет.

Результаты и их обсуждение. По классификации FIGO III стадия заболевания была выявлена у 47 (63.3 %), IV стадия – у 25 (34.7%) пациентов. Метастазы в лимфоузлах были выявлены у 18 (25 %), отдаленные метастазы - у 28 (38.9%) пациентов. Повышение уровня опухолевого маркера СА-125 было выявлено у 8 (11.1 %) больных. Циторедуктивные операции произведены 48 (66.7 %) больным. Химиотерапия с применением циклофосфана, карбоплатина, паклитаксела, доксорубицина, гемцитабина была проведена 67 (93.1 %) пациентам. Одногодичная летальность составила 44,4%, медиана выживаемости – 16,5 месяцев, трехлетняя выживаемость – 9,7%.

Выводы. В исследуемой группе пациентов метастазы в лимфоузлах были выявлены у 25%, отдаленные метастазы – у 38.9 % пациентов. Одногодичная летальность составила 44,4%, медиана выживаемости – 16.5 месяцев, трехлетняя выживаемость – 9.7 %.